


H

Chinese v29-v30

11

Vol XI



唐王素先生外臺秘要方卷二十九目錄 墮金瘡等四十七門

從高墮下方三首

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

墮損方三首

墮落車馬方六首

折骨方三首

傷筋方三首

筋骨俱傷方七首

折腕方一首

折腕瘀血方四首

蹉跌方三首

被打有瘀血方一十三首

被打損青腫方七首

許仁則瘰癧吐血及墮損方三首

金瘡禁忌序一首

金瘡預備膏散方三首

金瘡方一十一首

金瘡續筋骨方三首

金瘡止痛方五首

金瘡生肌方四首

金瘡去血多虛竭內補方二首

金瘡中風方八首

諸瘡中風寒水露方五首

被刀箭傷方一十一首

竹木刺不出方一十六首

狐尿刺方二首

狐刺方五首

惡刺方三首

灸瘡方四首

灸瘡膿不差方三首

火燒瘡及火油天火瘡方三首

火灼爛壞方五首

湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

湯火瘡無問大小方四首

湯火爛瘡方五首

湯煎膏火所燒方四首

漆瘡方二十七首

侵淫瘡方七首

月蝕瘡方一十二首

尚德按侵
疑當作浸

代指方一十一首

肉刺方二首

手足逆臚及瘰癧方二首

去黑子方二首

減癰疽方一十七首

甲疽方五首

手足皸裂方五首

疣目方一十九首

疣贅疵黑子雞瘻方六首

唐王壽先生外臺秘要方卷二十九

宋朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程衍道敬通父訂梓

從高墮下方三首

千金瘡丈夫從高墮下傷五臟微者唾血甚者吐血及金瘡傷絕崩中皆主之方 阿膠炙乾薑各二艾

葉芍藥各三 右四味切以水八升煮取三升去滓入膠令消分二服羸人三服女人產後崩中傷

下血過多虛喘腹中絞痛下血不止服之悉愈

又瘡從高墮下瀉血及女人崩中方 當歸二分大黃一分 右二味搗為散酒服方寸匕日三范汪同並出第二十六卷

尚德按千金大黃二分

千金翼膠艾湯主男子傷絕或從高墮下傷五臟微者嘔血甚者吐血及金瘡經內絕方 阿膠炙艾葉

芍藥 乾地黄各三兩 乾薑 當歸 甘草炙芍藥各二兩 右八味切以水八升煮取三升去滓內膠令

尚德按千金阿膠艾葉各二兩乾薑一兩

烱分再服羸人三服此湯正主婦人產後崩中傷下血多虛喘欲死腹痛血不止者服之良出第十卷中

又按痛字下千金有下字

從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首 廣濟瘡從高墮下內損瘀血消血散方 蒲黃十分 當歸 乾薑 桂心各八分 大黃十二分 蠶蟲四分 右

六味搗為散空腹以酒服方寸匕日再漸漸加至一匕半忌生葱豬肉出第四卷中 肘後瘡卒從高墮下瘀血服心面青短氣欲死方 取胡粉一錢匕以水服之備急文仲同

又方 煮大豆或小豆令熟飲汁數升和酒服之彌佳千金備急文仲同一云大豆二升煮令熟取汁二升去豆以醇酒六七升和飲之一日飲盡小豆亦佳

又方 生乾地黄二兩熬末以酒服之

又方 生地黃搗取汁服一升或二升尤佳

從高墮下方三首 從高墮下瘀血及折傷內損方一十八首

又方 烏鴉翅羽二七枚燒末酒和服之即當吐血也如得左羽尤佳

又療從高墮下若為重物所頓策得瘀血方 豆豉三升沸湯二升漬之食頃絞去滓內蒲黃三合攪調

頓服之不過三四服神良 刪繁小品文仲備急集驗千金同

又方 烏梅五升去核以飴糖五升煮稍稍食之自消 文仲備急千金同

又方 取茅連根葉搗絞取汁一二升服之不過三四服愈冬用根

又方 刮琥珀屑酒服方寸匕取蒲黃二三匕日四五服良

又方 末虎角酒服三方寸匕日三 千金同

又方 取敗蒲薦燒灰以酒服方寸匕 並出第三卷中

深師療從高墮下傷內血在腹聚不出療下血方 取好大黃二枚桃仁三十枚 右二味搗以水五升煮取

三升分為三服去血後作地黃酒服隨能服多少益血過百日成微堅者不可復下之虛極殺人

又療墮落瘀血桃枝湯方 桃枝一握中芒硝五分大黃四兩當歸 甘草炙桂心各二兩蟲蟲二十枚去足熱水蛭

二十枚桃仁五十枚去 右九味咬咀以水八升煮取三升去滓溫分三服內消

又療墮落積瘀血消血理中膏方 大黃二兩猪脂一斤桂心 乾薑各一兩當歸二兩通草 亂髮各一兩 右七

味切以膏煎髮令消盡搗藥下篩須令絕細下膏置地內諸藥攪勻微火煎之三上三下即藥成去滓

以好酒服一兩日二服一方不去滓 並出第二十六卷中

千金療從高墮下及被木石所逐或因落馬凡是傷損血瘀凝積氣急欲絕無不療方 淨土五升蒸之

令極熱分半以故布數重裹之熨病上勿令大熱恐被肉候冷即易之以痛止即已但有損傷並以此

法療之神效已死不能言者亦活三十年亦差

又療從高墮下損有瘀血方 蒲黃八兩附子一兩地右二味為散以酒服五六錢匕日三不知增之 並出第二十六卷中

尚德按千金服方寸

尚德按疑當作握

通按
折也

近效土質汗癢折傷內損有瘀血每天陰則疼痛兼癰產婦產後諸疾神效方

血下血婦人產後諸血並酒消服之亦敷病處出西諸如凝血蓄人前 三月採益母草一重擔一名夏

甘草松香裡乳地黃並煎血成之今以益母成煎故謂之土質汗也 右一味揀擇去諸雜草及乾葉以新水淨洗於箔上攤曬令水盡則用手扳斷可長五寸勿用刀切即

置鑊中量水兩石令水高草三二寸則縱火煎候益母草糜爛水三分減二漉去草取五六斗汁瀉入

盆中澄之半日以綿濾取清汁盆中滓澱並盡棄之其清汁於小釜中慢火煎取一如稀錫每取梨許

斗大煖酒和服之日再服和羹粥契並得如遠行不能將稀煎去即更鍊令稠硬停作小丸服之七日

內則疼痛漸瘳二七日平復或有產婦惡露不盡及血暈一兩服即差其藥兼療風益心力無所忌

史處吏部李郎中服之得力

墜損方三首

廣濟療墜損骨肉苦疼痛不可忍方 故馬甕兩段其甕欲得故膩者於鑊中以酒五六升著一抄鹽煮

令熱即內甕於鑊中看甕熱使用裹所損處冷即易之勿令久熱傷肉如是三五遍痛定即止仍服止

痛藥散即漸差

又療男子虛勞墜傷內損吐血不止欲死面目黑如漆者悉主之方 黃耆 芍藥 當歸 芍藥 各三

甘草三兩 生薑八兩 右六味切以水九升煮取二升五合去滓分溫三服用別相去六七里並出第

近效療墜損方 生地黃一斤分為三分 右每服取一分熬令焦黃以酒半升煎一兩沸絞去滓令溫

煖得所食前日三無所忌馬墜亦療之

墜落車馬方六首

肘後療忽落馬墜車及墜屋坑崖脫傷身體頭面四肢內外切痛煩躁叫喚不得臥方 急覓鼠矢無問

多少燒搗末以麝膏和塗封痛處急裹之仍取好大黃如雞子大以亂髮裹上如鴨子大以人所裁白

越布衫領中間餘布以裹髮外乃令大燒煙斷搗末屑薄以酒服日再三無越布餘布可強用常當預

備此物為要備急集驗古今錄

折骨方三首

千金療凡人墮落車馬心腹積血唾吐血無數方 乾藕根末酒服方寸匕日三如無取新者搗取汁服

之尤妙

又療墮馬及樹崩瘀血腹滿短氣方 大豆五升水一斗煮得二升半去豆頓服劇者不過三服並出第六

尚德按千金樹字下

千金翼療落馬墮車及諸傷脫折臂脚疼痛不止方 黃耆 芍藥各三兩 乾地黄 當歸 附子 炮通草

續斷 桂心 乾薑 各二兩 蜀椒 汁一合 烏頭 炮 右十一味搗為散先食酒服五分匕日三忌如常法

救急療墮馬落車被打傷脫折臂呼喚痛聲不絕服此散呼喻之間不復大痛三日筋骨相連當歸散方

當歸 熟地 桂心 甘草 炙 蜀椒 汗 各二分 烏霸 熟 附子 炮 澤蘭 熟 右七味搗為散酒服方寸匕日三

小兒被奔車馬所損裂其膝皮肉決見骨即絕死小蘇啼不可聽聞服之便眠十數日便行走其神驗

如此忌同前方千金翼深師同

近效療墮馬內損方 取盧藥一小兩搗為末牛乳一盞煎五六沸和服李諫議云盧藥以羊肉汁和服

一日內不用喫菜極效出第一卷中

折骨方三首

肘後療凡脫折折骨諸瘡腫者慎不可當風臥濕及多自扇若中風則發瘡口噤殺人若已中此覺頸項

強身中急束者急服此方 竹瀝飲三二升若口已噤者可以物拗開內之令下禁冷飲食及飲酒竹瀝

卒燒難得多可合束十許枚併燒中央兩頭承其汁投之可活小品備急文仲古今

千金療脫折骨痛不可忍方 取大麻根葉無問多少搗取汁飲一小升無生青者以乾者煮取汁服亦

主墮墜打槌瘀血心腹脹滿短氣良出第二十卷中

通按盧音 盧藥生 胡同似乾 茅黃赤色 見陳編器 本草

尚德按千金翼先食 故溫酒服 一方寸匕 尚德按千金注引之 三字上有 十字

救急療骨折接令如故不限人畜也方 取鉅鐸銅錯取末仍搗以絹篩和少酒服之亦可食物和服之
不過兩方寸匕以來任意斟酌之出第九卷中

傷筋方三首

千金療被傷筋絕方 取鹽頭中腦及足中髓熬之內瘡中筋即續生

又方 搗葛根汁飲之葛白屑熬令黃敷瘡止血並出第二十六卷中

救急續斷筋方 取旋復草根淨洗去土搗量瘡大小取多少敷之日一易之以差為度又出第九卷中

筋骨俱傷方七首

肘後療腕折四肢骨破碎及筋傷蹉跌方 爛搗生地黃熬之以裹折傷處以竹片夾裹之令過病上急

縛勿令轉動一日可十易三日即差千金調經急文仲古今錄驗同

又方 取生枯薑根搗之以塗損上以重布裹之熱除痛止備急同

又方 搗大豆末合豬膏和塗之乾即易之並出第三卷中

深師療折腕傷筋骨槐子膏方 槐子中仁 秦光 白木 續斷各一桂心欬巴豆十枚去皮心熬大附子一枚

炮 右七味咬咀以醇苦酒漬槐子等一宿以成鍊猪脂二斤於微火上煎三上三下候膏成絞去滓

溫酒服棗子許一枚日三并塗敷忌生葱豬肉冷水蘆笋桃李雀肉等出第二十六卷中

千金療四肢骨碎及傷筋蹉跌方 生地黃多少熟搗熬以裹傷骨處頻易驗同

又方 鼓三升以水七升漬之絞去滓取汁飲止煩悶古今錄同

又方 乾地黄 當歸 獨活 苦參各二兩 右四味搗末以酒服方寸匕日三服並出第二十六卷中

折腕方一首

深師卓氏膏 大附子四枚生用去皮 右一味切苦酒漬三宿以脂膏一斤煎之三上三下膏成敷之亦療卒

中風口噤頸項強出第二十卷中

通按千金論此方下云若血凝在折處以刀子破開去血

尚德按千金以水二升漬

折腕瘀血方四首

千金療折腕瘀血方 蝨蟲去足壯丹等 右二味為散以酒服方寸匕血化成水

又方 大黃 兩六桂心二兩桃仁去皮 右三味切以酒六升煮取三升分三服當下血差 並出第二十六卷中

千金翼療折腕瘀血方 菴蘭草汁飲之亦可作散服 出第十卷中

古今錄驗療折腕瘀血方 蒲黃 升當歸兩 右二味搗散酒服方寸匕日三先食服之 千金同出第十四卷中

蹉跌方三首

深師療蹉跌補絕復傷地黃散方 乾地黄 分十桂心 乾薑 芎藭 甘草 炙當歸各二分芍藥五分 右七

味搗為散先食以酒服方寸匕日三服

又方 大豆 黑令大黃兩二桂心兩 右三味搗為散分為三劑酒和服忘生葱又大黃一兩生地黃三

兩切熟以水酒二升煮取一升頓服之差 出第二十卷中

范汪蹉跌膏兼療金瘡方 當歸 續斷 附子 去皮細辛 甘草 炙通草 芎藭 白芷 牛膝 略二蜀

椒仁 右十味咬咀以猪膏二斤煎以白芷色黃膏成絞去滓日再以摩損處 出第十卷中

被打有瘀血方一十三首

肘後療若為人所打舉身盡有瘀血方 刮青竹皮 升亂髮 如雞子大四枚燒反 延胡索 兩 右三味搗散以一合

酒一升煎三沸頓服日三四 備急范汪同

又療被打擊有瘀血在腹內久不消時時發動方 大黃 兩二乾地黄兩 右二味搗散為丸以酒服三十

九日再為散服亦妙 備急文仲小品范汪等同並出第三卷中

范汪療被打有瘀血方 大黃 兩二桃仁去皮 蝨蟲 各二十一枚 右三味搗蜜丸四九即內酒一升煎取

匕合服之 備急肘後同

又方 薑葉 切一當歸兩 右二味為末以酒服方寸匕日三 並出第十卷中

通按一方
無蛆到天

尚德按十
金杏仁五
十枚以水
二升煮取
九合分二
服
尚德按十
金以水三
升煮

尚德按十
金云新殺
羊肉煮熱
封之
尚德按十
金云水和
塗之
尚德按十
金作摩

備急若久血不除變成膿者宜此方 大黃三枚 桃仁三十枚 右二味切以水五升煮取三升分三服當

下膿血不盡更作大仲肘

又若久宿血在諸骨節及脇肋外不去者方 牡丹 蠱蟲去足熱 右二味搗末以酒服方寸匕血化

成水小品文仲千金並

又方 大黃如雞子 蚯蚓夫一合 右二味酒半升煮取三沸服之

又方 鐵一斤酒三升煮取一升服之又燒令赤投酒服之小品文仲肘後

千金療被打傷破腹中有瘀血方 蒲黃各二兩 當歸 桂心各二兩 右三味搗散以酒服方寸匕日三夜一

不能酒飲服之劉涓子方

又方 搗薏苡子末以敷瘡上

又凡有瘀血者其人喜忘不欲聞人聲胸中氣塞短氣方 甘草一兩 茯苓二兩 杏仁五合 右三味切以水

一斗煮取三升分為三服范汪

又被毆擊損傷瘀血腹滿方 豉一升以水二升煮二沸去滓再服不差重服之范汪出第二

張大仲劉涓子療被打腹中瘀血白馬蹄散方 白馬蹄燒令煙斷搗末以酒服方寸匕日三夜一亦療

婦人瘀血消化為水肘後備急

被打損青腫方七首

千金療被打頭眼青腫方 用新熟羊肉敷之

又方 大豆黃末和敷之

又方 牆上朽骨唾於石上研摩塗之乾即易

又方 釜月下土細末塗之

又方 羊皮上臥之

被打損青腫方七首 許仁則療吐血及墮損方三首

7

尚德接十
金泥接十

尚德接十
疑當作酥
又按經疑
當作經疑
疑也經疑
見膏滿方
李時珍本
草經疑下
引之
通按松藥
亦泥藥未
詳

又方 炙肥肉猪令熟搗上又炙猪肝貼之亦佳出第二十卷中
大仲療被打青腫方 以水磨桂塗之亦則以墻中朽骨磨塗之則平復也梁都督待中傳效也出第八卷中

許仁則療吐血及墮損方三首

許仁則論曰此病有兩種一者緣墮打損內傷而致此病一者緣積熱兼勞而有此病若內傷自須依前墮內損大便血等諸方救之若積熱累勞吐血狀更無餘候但覺心中惛惛似欲取吐背上煩熱便致此病宜依後雞蘇七味湯桑白皮八味散療之方 雞蘇合生地黃切青竹茹各一升桑白皮略六小薊根切六生葛根合六右藥切以水九升煮取三升去滓分溫三服服別相去如人行十里久若一劑得力欲重合服至四五劑尤佳隔三四日服一劑如未定則宜合後桑白皮八味散服之

桑白皮散方 桑根白皮 生薑屑各六兩柏葉 雞蘇各四兩小薊根五兩乾地黃五兩青竹茹一升地菰三兩

右藥搗散煮桑白皮飲和一方寸七日再服漸漸加至二三匕以竹漚下亦得

又此病有兩種一者外損一者內傷外損因墮打壓損或手足肢節眩頸項傷折骨節痛不可忍覺內損者須依前內損法服藥湯如不內損只傷肢節宜依後生地黃一味薄之法及芥子蘇等摩之方 生地黃無問多少淨洗搗碎令爛熬之候水氣盡及熟以薄折處冷即易之如骨蹉跌即依療折傷法縲縛兼薄羊脂生龜生鼠等法為有所損此不復載如傷處損輕搗芥子和蘇以摩傷處若被打墮壓傷損急卒雖不至昏悶腹內無覺觸然身之中相去非遠外雖無狀內宜通利或慮損傷氣不散外雖備用諸方腹內亦須資藥但不勞大湯如前內損欲死者服湯取利欲用時間小小諸物服之理應無嫌其法略出如後小便酒煮生地黃每始王木蜈木梓葉盧藥槍藥猪脂及石蜜白石地菰延胡索赤泥藥以上十一物並出下卷異界同

金瘡禁忌序一首

肘後凡金瘡去血其人若渴當忍之常用乾食並肥脂之物以止渴慎勿鹹食若多飲粥輩則血溢出殺

人不可救也又忘嗔怒大言笑思想陰陽行動作勞勿多食酸鹹飲酒熱羹臠輩皆使瘡痛腫發甚者即
死瘡差後猶爾出百日半年乃稍復常耳凡金瘡傷大窗眉角腦戶臂裏跳脈脾內陰股兩乳上下心鴛
尾小腸及五臟六腑輸此皆是死處不可療也又破腦出血而不能言語戴眼直視咽中沸聲口急唾出
兩手妄舉亦皆死候不可療若腦出而無諸候者可療又瘡卒無汗者中風也瘡邊自出黃汁者中水也
並欲作瘡候可急療之又痛不在瘡處者傷經也亦死之兆又血出不可止前赤後黑或白肌肉腐臭寒
冷堅急者其瘡難愈亦死也

並出第
三卷中

金瘡預備膏散方三首

肘後療金瘡膏散三種宜預備合以防急疾之要續斷膏方 蜀續斷 蛇銜 防風

各三

右三味切

以豬脂三斤於東向露窻煎之三下三上膏成去滓若深大瘡者但敷四邊未可使合若淺小瘡者但
通敷便相連令止血住痛亦可以酒服如杏子大

又治葛蛇銜膏方 蛇銜 薔薇根 續斷 治葛

各二

當歸

附子

各一兩

防風

黃芩

澤蘭

各一

松脂 柏脂

各三

右十一味咀以豬脂二斤煎之別以白芷一枚內中候色黃即膏成去滓濾以

密器收貯之以塗瘡無問大小皆差不生膿汁也

出第
四卷中

深師預備金瘡散方 乾薑 甘草 炙桂心

各一

當歸

三莖

蜀椒

各三兩

右六味搗散以酒服方寸

匕日三

肘後同出第
二十九卷中

金瘡方一十一首

肘後療金瘡方 割斲方一寸燒灰研以敷之差

又方 杏仁去皮尖搗如泥石灰分等以豬脂和之淹足合煎令杏仁黃絞去滓以塗瘡上日五六遍愈

又方 燒故青布作灰敷瘡上裹縛之數日差可解去

又方 以蛇銜草搗敷之差

金瘡預備膏散方三首 金瘡方一十一首

又方 狼牙草莖葉熟搗敷貼之兼止血 按一方此草

又方 五月五日掘葛根暴乾搗末敷瘡上止血止痛

又方 釣樟根出江南刮取屑敷瘡上有神驗

又方 紫檀末以敷金瘡止痛止血生肌

又方 燒牡蠣末敷之佳凡裹縛瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好 並出第

近效金瘡或壓損斷裂方 剝取新桑皮作線縫之又以新桑皮裹之以桑白汁塗之極驗小瘡但以桑

皮裹即差

又金瘡灸瘡火燒瘡等方 蠟如胡 桃仁 杏子 爛楊柳仁 陸香 合

塗帛上貼瘡此方甚效

金瘡續筋骨方三首

千金瘡金瘡粉散辟風水續筋骨止血方 石灰 地菰苗 細辛 旋復根 葛葉 猪膏 青蒿

麥門冬苗 益母苗 不暇多 右九味搗取汁和石灰作餅子暴乾末如粉以敷傷瘡上止血止痛生

肌五月五日合之神效 出第二十卷中

必效療被斫筋斷者續筋方 旋復根搗汁漉瘡中仍用渾封瘡上即封裹之十五日即斷筋便續矣更

不須開易 此方出薛景仲家藏 奴用效出第四卷中

古今錄驗療金瘡中筋骨續斷散方 續斷 五乾地黃 蛇銜 地榆 杜衡 各四 乾薑 蜀椒 汗細辛

桂心 略一當歸 芍藥 從蓉 芍藥 略三 人參 甘草 炙附子 各二兩 右十六味搗為散以酒飲

和服方寸匕日三服忌海藻菘菜生菜生葱猪肉冷水 一方無杜衡有牡蠣 出第三十四卷中

金瘡止痛方五首

范汪療金瘡內塞止痛地榆散方 地榆根 白斂 各二 附子 一分 當歸 四分 芍藥 白芷 芍藥 各三

右七味搗散以酒飲服方寸匕日三服忌同前方

又金瘡內塞逐痛方 黃芩 當歸_{各三} 甘草_炙 細辛 烏頭_{炮各二兩} 乾薑_{一兩} 白芷_{四兩} 右七味搗篩以酒

飲服一錢匕日三可至二錢匕忌同前方

又金瘡止痛方 馬蹄燒灰三指撮以酒和服之_{並出第十卷中}

千金凡金瘡若刺瘡痛不可忍者方 葱白一把水三升煮數沸漬洗瘡上痛即止_{亦治因水入疼痛翼}

_{中卷}

古今錄驗療金瘡止痛壯蠅散方 壯蠅_{二分} 石膏_{一分} 右二味下篩以粉瘡痛即止_{出第三十卷中}

金瘡生肌方四首

廣濟療金瘡生肌破血補勞消瘡輕身紫葛湯方 紫葛三握細剉之以順流河水三大升煎取一升二

合去滓空腹分三服若冷以酒一大升水二升和煮取一大升無忌_{出第六卷中}

范汪療金瘡內塞止痛生肌肉散方 當歸 甘草_炙 肉蓯蓉 芎藭 芍藥 蜀椒_汗 吳茱萸 乾薑

桂心 白芨 黃耆 厚朴 人參 右十三味等分搗為散以酒飲服一方寸匕日三服忌如前方

又療金瘡生肌白膏方 白芷_{六兩} 乾地黄_{半兩} 芎藭_{六兩} 甘草_{半兩} 當歸 白斂 附子_{各十八} 蜀椒

{半合} 右八味咬咀以猪脂五斤合煎三上三下藥成去滓塗瘡上日再忌同前方{並出第九卷中}

古今錄驗療金瘡生肌散方 甘草_{一斤} 黃柏_{八兩} 當歸_{四兩} 右三味搗末以封瘡上日再_{出第三十卷中}

金瘡去血多虛竭內補方二首

千金療金瘡去血多虛竭內補方 當歸_{三兩} 芍藥 細辛_{各五} 乾薑_三 甘草_{二分} 右五味為散以酒服

方寸匕日三夜一忌同前方_{出第二十卷中}

古今錄驗療金瘡去血多虛竭內補方 蜀椒_三 乾薑_三 茯苓 甘草_炙 芍藥 當歸 芎藭 桂心

黃芩 人參 黃耆 厚朴 吳茱萸 桑白皮_{各一} 右十四味搗散以酒服方寸匕日三白芨無

尚德按細辛千金作辛夷
通按此即前范汪止痛生肌方但多黃芩

金瘡生肌方四首 金瘡去血多虛竭內補方二首

二

桑皮無白
髮且分兩
不同耳

桑白皮千金翼同
出第三十四卷中

金瘡中風方八首 諸瘡中風寒水露方五首

金瘡中風方八首

肘後療金瘡中風方 蜀椒量瘡大小用麴作餽餽瘡灰中炮令熟及熱開一小口當瘡上掩之即引風
出可多作取差 備急小品同
出第三卷中

必效療金瘡中風角弓反張者方 取杏仁碎之蒸令饅搗絞取脂服一小升許兼以摩瘡上即差

又方 取蒜一大升破去心以無灰酒四升煮蒜令極爛並滓服一大升以來須臾汗如雨出則差

又療口噤不能語方 蔓菁子淨洗一升搗令細粘手撮為炷以灸瘡上一兩度熱徹即差兼服後方

又療因瘡著風方 雞糞一合烏豆二升煎令淨二味相和於鑊中熬令焦黑及熟瀉出以酒二大升淋
之與服隨多少令盡取汗差如無汗更作服

又療因瘡著風角弓反張方 取葦若根可瘡大小截令平如無大者並縛數根稱瘡以為限獨脂一大

合鹽末一雞子黃大和膏於火上溫之令膏鹽相得不用過熱熱即傷肉以煖得炷瘡上冷即易之為
兩炷於炷器中燒之更相用以差止驗

又方 生雞子為麻沙二味合煎稍稠待冷以封瘡上

古今錄驗療金瘡得風身體痠強口噤不能語或因破打而得及斧刀所傷得風臨死總用此方無有不
差瓠蘆燒麻燭熏之方 取未開瓠蘆一枚長柄者開其口隨瘡大小開之令瘡相當可繞四邊開塞勿
使通氣上復開一孔如盤口取浮麻子燭兩條並然瓠蘆向上燭盡更續之不過半日即差若不止亦
可經一兩日熏之以差為度若燭長不得內入瓠蘆可中折用之 出第二十
四卷中

諸瘡中風寒水露方五首

文仲云凡以八九月刺手足金瘡及諸瘡中寒露水冷毒皆殺人不可輕也瘡之方 生竹若桑枝兩條
著瘡火中令極熱斫斷炷瘡口中熱氣盡更易一枚盡二枚則瘡當爛乃取薤白搗以綿裹著熱灰中

使極熱去綿以雞白薄瘡上布帛急裹之

附後十金同

又瘡若已中水及惡露風寒腫痛方 以鹽數合著瘡上以火炙之令熱達瘡中畢以蠟內竹管插熱灰

中令烱以滴入瘡中即使愈若無鹽用雞白但單用蠟亦良

附後同出第五卷中

備急瘡諸瘡中風寒水露腫痛云因瘡而腫者皆中水及中風寒所作也其腫氣入腹則殺人也方燒

黍穰或平馬乾糞桑條輩多烟之物掘地作坎於中燒之以版掩坎上穿版作小孔以瘡口當孔上熏

之令瘡汁出盡乃止又滴熱蠟瘡中佳

集驗時後天仲同

又方 以桑灰汁溫之以漬瘡大良姚云神驗

附後十金同出第十八卷中

近效瘡因水入疼痛方 取生葱一束搗以腳踏上須臾更著之差

李諫議房給事錄試效

破刀箭傷方一十一首

劉涓子瘡金瘡箭在肉中不出方 半夏三兩白欬三兩 右二味下篩以酒服方寸匕日三淺者十日出

深者二十日出終不住肉中

附後十金文仲小品同出第三卷中

附後瘡卒被毒箭方 搗藍青絞取汁飲之並薄瘡上若無藍取青布漬之絞取汁飲之亦以汁淋灌瘡

中

附後范汪文仲備急千金同

又方 煮藕取汁飲之多多益善

附後文仲備急同

又方 但多食生葛根自愈或搗生葛絞取汁飲之乾者煮飲之

小品千金集驗備急文仲同

又方 乾薑鹽等分搗末敷瘡上毒皆自出

范汪附後備急一作乾葛

又凡毒箭有三種文廣夷俚用焦銅作鏃次嶺止用諸蛇蟲毒螫物汁著管中潰箭鏃此二種總傷皮便

洪腫沸爛而死唯射猪犬雖因猶得活以其噉人糞故也人若有中之便即餐糞或絞瀝取汁飲之並以

塗瘡上須臾即定不爾不可救也又一種是今之獵師射麀鹿用射罔以塗箭鏃人中之當時亦因頓著

寬處者不死若近胸腹亦宜急療之令葛氏方是射罔者耳

通按本草
葛根大明
云署毒箭
傷則乾薑
當是乾葛
若生薑汁
則能解藥
毒故後方
用之

尚德按白
飲千金作
白鹽

又療箭鏑及諸刀刀在咽喉胸膈諸處不出者方 牡丹分白飲分 右二味搗末以溫酒服方寸匕

日三服刀自出附後備急千金
同出第九卷中

小品療被毒箭傷方 雄黃末敷之愈附後千金集驗同
此方亦應蛇毒

又方 食麻子數升愈附後卷第十卷中

集驗療毒箭方 以鹽滿瘡中灸鹽上三十壯附後

又方 煮蘆根汁飲一二升附後卷第十卷中

又療刀箭瘡有血不止方 以小兒矢塗封之三日即差並不傷人出第九
卷中

竹木刺不出方一十六首

劉涓子竹木刺不出方 鹿角燒灰末以水和塗之立出久者不過一夕集驗大仲備急附後范注古
今錄驗深師同出第三卷中

肘後療竹木刺不出方 取羊糞燥者燒灰和脂塗之刺若未出重敷之刪繁集驗千金備急深
師同云用乾羊糞末

又方 嚼白梅塗之集驗千
金同

又方 王不留行末服之並敷上即出集驗大仲深
師千金同

又方 搗烏梅水和塗之刺上立出千金用白梅並
出第三卷中

深師療刺不出方 以鹿腦厚敷上燥復易之半日即出出第二十
九卷中

集驗療刺藏在肉中不出方 用牛膝根莖合搗以敷之即出縱瘡合其刺猶自出附後備急支仲范注
深師千金同出第九
卷中

千金瘰癧刺在肉中不出方 煮瞿麥汁飲之日三立出

又方 溫小便漬之

又方 白茅根燒末以膏和塗之亦主諸瘡因風致腫附後
同

又方 薔薇燒灰以水服方寸匕日二度十日刺出

又方 燒鑿柄為反酒服二方寸匕

又方 酸棗核燒末服之差

又方 頭垢塗之並出第二十六卷中

丈仲療竹木刺不出方 刮象牙屑水和塗刺上立出附後范汪備急源

救急療竹木刺傷方 嚼豉封之立差千金附後同

狐尿刺方二首

千金翼論凡諸螳螂之類盛夏之時多有孕育遊諸物上必有精汁其汁乾久則有毒人手觸之不疑之間則成其疾故曰狐尿刺日夜燔痛不識眠睡百方療不能差方 但取蒲公英莖葉根斷之取白汁塗

令厚一分即差神驗出第二十卷中

肘後療狐尿棘刺人腫痛欲死方 以熟桑柴灰漬之冷復易水差備急崔氏同

狐刺方五首

崔氏療狐刺方 取好豉心以足為限但覺被刺即熟嚼豉以薄之少頃看豉中當見毛不見又速嚼豉數薄之以晝夜勿絕但以毛盡便愈

又方 熟搗杏仁細研煮一兩沸承熟以浸刺處數數易之大良古今錄

集驗療狐刺方 熟魚汁灌瘡中

備急療狐刺方 以熟蠟灌瘡中又煙熏之令汁出愈此狐所溺之木猶如蛇蟄也附後小品文仲

必效主狐刺痛如鳥啄者方 生枯薑香豉二味等分搗之為餅敷患處乾即易之效段家方出

惡刺方三首

千金翼療惡刺方 五月蔓菁子搗末和烏牛乳封之無烏牛但是牛乳亦得本方云人乳亦得

古今錄驗療惡刺方 取未煮餅油脂以麴和油調須臾著瘡上即愈粉以麴和油

十卷必要 狐尿刺方二首 狐刺方五首 惡刺方三首 灸瘡方四首

又方 取麴末和獨頭蒜搗之內瘡孔中蟲出即差

出第三十卷中

灸瘡方四首

肘後論曰凡灸不依明堂脈穴或是惡日神惡時殺病人年神人神所犯天地昏暗日月無光久積陰沉

及灸日食毒物方畢或灸觸犯房室等其灸瘡洪腫發作疼痛病人加甚灸者疾本不痊增其火毒日夜

楚痛過其凡愚取次亂灸此皆因火毒傷臟即死矣今用方瘡之 柏白皮兩當歸兩薤白握 右三味

切以猪脂一升煎三上三下以薤白黃絞去滓以塗瘡上亦療風水中瘡大瘡出第三卷中

集驗瘡灸瘡痛腫急方 搗薤中黃土末之以水和煮令熟以漬之深即千金 肘後同

又瘡灸瘡癰白膏生肌肉止痛方 薤白當歸 白芷兩羊髓斤 右四味以咀以羊髓煎白芷色

黃藥成去滓以敷瘡上日二肘後千金文仲 同出第八卷中

千金瘡灸瘡方 甘草灸當歸略 胡粉六分羊脂六分 右四味切以猪脂五合煎之去滓以敷瘡上

忌海藻松菜出第二十卷中

灸瘡膿不差方三首

肘後瘡灸瘡膿不差方 白蜜 烏賊骨兩末 右二味相和以塗之千金

千金瘡灸瘡膿不差方 臘月猪脂斤薤白切胡粉兩 右三味先煎薤白令黃去之綿裹石灰一

兩更煎去之入胡粉令調敷之日三

又方 石灰一兩末細絹篩以猪脂和相得微火上煎數沸先以煖湯洗瘡訖以布裹灰熨瘡上三過便

以藥貼瘡上灸之又搗薤數之肘後同出中 卷中

火燒瘡及火油天火瘡方三首

集驗凡被火燒者初慎勿以冷水冷物並井下泥火瘡得冷即熱氣更深轉入至骨爛壞人筋掣縮者良

由此也

尚德按千金瘡白一握

高德樓
金治火爛
瘡

通樓象印
今楚草又
名黃草雞
子黃當是

又療卒被火燒苦劇悶絕不識人方 取新熟小便飲一升及冷水和蜜飲之口噤不開者可拗開灌之

其悶差然後瘡外乃善

千金古今錄驗崔氏
小品同出第八卷中

千金療火瘡方 未熟麻油和梔子仁末塗之唯厚為佳已成瘡者歸白糖灰粉之即差

出第二十
六卷中

近效療火油及天火瘡初出似沸子漸漸大如水泡似火燒瘡赤色熟翕翕須臾浸淫漸多急速者是也
方 芸臺菜不限多少搗絞取汁芒硝大黃生鐵衣各等分搗大黃末相和芒硝等以芸臺汁調如稀糊
以无筆點藥敷瘡上乾即再點頻用極有效閩師云芸臺冬月煮取汁洗亦可

火灼爛壞方五首

劉涓子療火燒人肉爛壞麻子膏方 麻子合柏白皮 山梔仁 碎白芷 甘草 柳白皮略一 右六

味咬咀以猪脂一升煎三上三下去滓以塗瘡上日三

出第五
卷中

集驗療火爛瘡膏方 柏白皮 生地黃研各四兩 苦竹葉 甘草略四 右四味切以猪脂一斤煎三上三

下藥成瀉去滓以摩瘡上日再摩

千金無地黃深師千金劉涓子范注同出第八卷中

千金療火灼爛瘡方 榆白皮熟嚼封之差

又火瘡敗壞方 柏白皮切臘月猪脂合淹相和煮四五沸色變去滓塗瘡

范注同出第
二十六卷中

又方 柏白皮 生地黃 黃芩 蛇銜 梔子 苦竹葉略一 右六味切以羊髓半升煎之三上三

下去滓塗瘡上差

湯火所灼未成瘡及已成瘡方一十一首

肘後療湯火所灼未成瘡者方 取暖灰以水和習習爾以敷之亦以灰汁洗之

又方 黍米 女麴粉 右二味各異熬令黑如炭擣下以雞子白和塗之良

又方 取蘇將根洗去主燒反梔子黃和塗之

又方 取柳白皮細切以猪膏煎以塗之以相白皮彌佳凡此以上三方皆能止痛疾仍不成瘡也

火灼爛壞方五首 湯火所灼未成瘡及已成瘡方十一首

雞子白

尚能祛風
疑當作膠

又方 以小便漬洗之

又方 以苦酒和雄黃塗之

又若已成瘡者方 以白蜜塗瘡上取竹蘇貼之日三出第7卷中

范汪療湯火灼瘡方 破雞子取白塗之附後同

又方 以豆醬汁塗之附後文仲同並出第九十一卷中

備急療湯火灼瘡方 柳皮燒灰如粉敷之附後同

又方 猪膏和米粉塗之日五六過良此二方既令不痛又使速愈又無癰痕已試有效附後同出第八卷中

湯火瘡無問大小方四首

崔氏療湯火瘡無問大小秘要方 取狗毛辟剪烱膠和之以遍封瘡上一封之後比至加落亦不痛救急

文仲療湯火瘡無問大小秘要方 新熟牛糞塗之良崔氏同出第十七卷中

救急療湯火瘡無問大小秘要方 取粟熬令焦黑投水中攪之良久濾取汁重煎如糖以敷瘡上並滅

癰崔氏同

又方 取黍米煮粥和雞子白敷瘡良並出第五卷中

湯火爛瘡方五首

肘後療湯火爛瘡方 取石膏搗末以敷之立愈古今錄驗同出第三卷中

備急湯火灼爛方 白欬末塗之立有效

又方 以竹中蠹蟲末塗之良

又方 石灰末以水和塗之既即易之並出第八卷中

古今錄驗療湯火爛方 取商陸根搗末以粉瘡上出第四十卷中

湯煎膏火所燒方四首

肘後療為沸湯煎膏所燒火爛瘡方

丹參細切以羊脂煎成膏敷瘡上千金備急文仲集驗同

又方 熟棗生胡麻如泥以厚塗瘡上

並出第

集驗被湯火熱膏所燒不問大小梔子膏方

梔子三十枚白欬

黃芩各五兩

右三味切以水五升麻油

一升煎令水氣竭去滓冷之以淋瘡令溜去火熱毒肌乃得完也作二日任用膏塗湯散治之

錄驗小品同出第八卷中

文仲滾湯煎膏所灼火燭所燒方

牛糞新者和以雞子白塗之此常用之亦不作瘡不痛神效

出第七卷中

漆瘡方二十七首

廣濟療漆瘡方 煮椒湯洗頻三五度又嚼糯米敷上乾即易之頻四五度即差忌麵肉飲酒

出第五卷中

肘後療卒得漆瘡方

以雞子黃塗之乾即易之不過三五度

文仲

又方 煮柳葉湯適寒溫洗之柳皮尤妙

集驗必效文仲千金同

又方 取生蟹黃塗之

又方 煮香蒿以漬洗之

深師古今錄驗同

又方 濃煮鼠耳莖葉洗之亦可擣取汁以塗之

集驗千金同赤木也

又方 嚼秫米以塗之

又方 以造酒小麴搗末以粉之乾即以雞子白和塗之良

又方 按慎大草若雞腸草以塗之漆姑草亦佳

深師千金翼同

又方 以羊乳汁塗之

深師同

又方 呪漆法是漆人見漆便漆著之

唾之曰漆吏丹陽漆無弟無兄漆自死丹亡二七頃鼠傷三唾之又

呪三過止則不復生瘡也

出第四卷中

通接鼠查
今山查也
赤爪木乃
其木名
尚德按爪
當作爪證
頻云懶巧
切

通按撥即
今泰來復
也

通按黃檗
即染黃色
之極木也

尚德格侵
疑當作浸

刪繁瘡漆瘡方 取蓮葉乾者一斤以水一斗煮取五升洗瘡上日再刪後崔氏文仲千金同

又方 芒硝五兩湯浸洗之刪後千金翼深師同出第九卷中

千金瘡著漆洗湯方 取磨石下滓泥塗之取差止大驗翼同

又方 礬石著湯中令消以洗之翼刪後同出第廿六卷中

千金翼瘡漆瘡方 貫衆搗末以塗之良乾以油和塗之集驗文仲刪後同

又方 取猪膏塗之文仲刪繁千金同

又方 宜噉肥肉集驗深師千金同

又方 嚼稬穀塗之出第十卷中

崔氏瘡漆瘡方 頻以鹽湯洗之大良

又方 以馬尿洗之差止

備急瘡漆瘡方 搗韭根如泥塗之煮薤葉洗之佳刪後深師崔氏同

又方 取蟹搗以塗之最妙或以水浸之取水數數洗之亦效

救急瘡漆瘡方 以鐵漿洗之隨手差頻為之妙出第八卷中

必效瘡漆瘡方 取漆姑草搗汁二分和芒硝一分塗之若無芒硝即扑硝最妙矣並熨之效

又方 濃煮杉木汁洗之數數用即除小兒尤佳出第四卷中

古今錄驗瘡漆瘡方 黃檗木一斤剉鹽一合二味以水一斗煮取五升去滓候冷以洗之即差王長華家神方

論曰此疾雖小有著者遍身頭面似癩癩浮腫生瘡痛癢毛髮脫落心煩恍惚不得眠睡因瘡之遲速為

他疾或便成風癩亦可畏也

侵淫瘡方之首

肘後瘰癧卒得侵淫瘡轉廣有汁多起於心不早療之繞身周匝則能殺人方 以雞冠血塗之良

又方 取牛糞新者絞取汁以塗之亦燒煙熏之

又方 胡鷺窠末以水和塗之大仲備急同

又方 取鯽魚長三寸者以少鼓合搗塗之亦療馬鞍瘡若先起四肢漸向頭面者難療也入取鯽魚油

煎去魚塗之大仲備急同

集驗瘰癧卒毒氣攻身或腫或赤痛或瘡并分散上下周匝煩毒欲死方 取生鯽魚切之如鱗以鹽和搗

遍塗瘡上乾復易之此為侵淫瘡也備急同出第八卷中

古今錄驗瘰癧侵淫瘡苦飢散方 苦飢一蛇皮燒半兩 露蜂房半兩 大豆梓梁上塵合 右五味為散以粉

粥和塗紙貼赤處日三甚良

又療侵淫瘡或鹽散方 戎鹽分二大黃分四蘭茹分 右三味搗散以酒和敷瘡上日三良

月蝕瘡方一十二首

廣濟瘡月蝕瘡方 自死青蛙 母豬蹄各一枚 甘草末 救月杖燒灰 右四味等分蜜和塗瘡上日二差

止

又方 五月五日乾蝦蟆燒一枚 石硫黃研 礬石一兩 右三味為散以敷瘡上日二差止小兒耳後瘡同用並

出第五卷中

肘後瘰癧大人小兒卒得月蝕瘡方 五月五日蝦蟆灰以猪膏和塗之差止大仲備急同

又方 於月望夕取兔矢仍內蝦蟆腹中合燒為灰末以敷瘡上差止集驗同

又方 取蘿摩草搗末塗之差

又方 燒蚯蚓矢令赤末以猪膏和敷之大仲備急千金

又云此瘡多在兩耳上及七孔邊隨月死生故名月蝕瘡也世言小兒夜指月所為實多者小兒也大仲備急

同

又方 水銀 黃連二兩 胡粉各一 松脂各一 右四味相和合研水銀消以塗瘡瘡如乾以臘月猪脂和

先以鹽湯洗拭然後敷之出第十卷中

集驗瘡月蝕瘡方 救月蝕蝕皮如手許大一片以苦酒三升漬一宿以塗瘡上或云燒作灰脂和敷之

崔氏

又方 虎頭骨二兩 浮萍屑一 右二味以猪脂一斤煎取膏黃成膏以塗瘡上崔氏

又方 茱萸根 地榆根 薔薇根 右三味各等分為散作湯洗瘡取藥塗瘡上日三崔氏

又方 然燭照瘡使燭熱氣相及瘡即愈崔氏古今錄驗同

千金翼瘡月蝕瘡惡肉方 斑蝥去足翅 石硫黃 蘭茹各一 右三味搗篩以塗瘡上如瘡乾以猪脂和

塗之日三出第二十卷中

代指方一十一首

小品代指者其狀先腫焮焮熱痛色不黯然後緣爪甲邊結膿劇者爪皆脫落亦謂之代指病也

又代指無毒正緣人筋骨中熱盛攪結故耳吳人名遭指野夫名為土盧即皆是代指疾也療方 單煮

甘草汁漬之或用芒硝湯漬之搗膏菜汁搗之但得一種浸搗之即差千金

肘後瘰癧代指方尚德按千金翼治指瘻效驗方取猪脂和薑末稍令熱內指甲中食頃即差 以猪膏和白善敷之數易差止深師千金翼同

土

又方 以指刺炆上熱飯中七遍大仲集驗深師

又方 取梅核中人熟搗以瀉苦酒和敷之須臾差止大仲

又指忽掣痛不可忍方 炙指頭痛處七壯愈千金

又指端忽發瘡方 燒鐵令熱勿令赤以灼之上二方俱主代指並出第

通按白善
即白聖俗
謂白土粉
者是

尚德按千
金翼瘡惡
肉作惡瘡
息肉日三
下有夜二
二字

通按鮮是諸魚醃而成此用鮮皮當是所伴鮮中魚皮也

尚德按侵疑當作浸

千金翼療代指方 先刺去膿炙鮓皮令熱以裹縛指令周匝痛即止便愈 十金同出第二十三卷中尚德按千金翼鮓字下有血

字文字下有鮓字縛作纏

崔氏論代指者是五藏之氣使然流注於十二源經脈熱衝手指不遂即代指也 當取熱湯急漬之即

出使滿七度便以冷水中浸之訖又復浸之如此三度即塗羊膽愈未成膿此方甚效或以猪膽或代

指纏之差 本方云訖乾封桂末便愈出第四卷中

備急療手指忽腫痛不已者名為代指方 和泥泥指令遍周匝厚一寸許以熱灰中炮之令燥視皮皺

即愈不皺者更為之良 文仲備急荒注同

又方 取梁米粉鐵罐中熬令赤以眾人唾和之塗上令厚一寸即消

又方 小便和鹽作泥厚裹之數易差錢針刺血出最妙 出第五卷中

甲疽方五首

崔氏夫甲疽之為病或因割甲傷肌或因甲長侵肉成瘡腫痛復緣靴窄研損四邊腫焮黃水出侵淫相

染五指俱爛漸漸引上脚跌泡漿四邊起如大燒瘡日夜培塿萬醫所不能療方 緣礬石五兩形色似

朴硝而緣色 右一味置於鐵版上聚炭封之以囊袋吹令火熾即沸流出色赤如融金看沸定汁盡

去火待冷收取按為末色似黃丹先以鹽湯洗瘡拭乾用散敷瘡上唯多為佳著藥訖以軟綿纏裹當

日即汁斷瘡乾若患急痛即塗少酥令潤每日一遍鹽湯洗濯有膿處則洗使淨其痂乾處不須近每

洗訖敷藥如初似急痛即塗酥五六日即覺瘡上痂漸剝起但依前洗敷藥十日即瘡漸漸剝剝痂落

軟處或更生白膿泡即捺破敷藥自然摠差神驗無比刑部張侍郎親嬰此病臥經六十餘日困頓不

復可言在京眾醫並經造問皆隨意處方了無效驗唯此法得效如神今故錄之以貽好事者 出第五卷中

救急療甲疽方 屋上馬齒菜 豈為膏木香 印成鹽 右三味各燒成灰並等分又取光明砂少許

於諸藥中拌摠和下篩為細散以敷瘡上乾即易之以差止當瘡未差以前不宜食雞猪魚肉腥穢酒

通按銀黃
黑者名雞
屎

尚德按瘡
疑當作堅

又按蕭癰
當作蕭

通按數奇
單折裂也

足中寒瘡
也

蒜等差後仍三十日忌酒良

出第九卷中

必效療甲疽赤肉生甲邊上裏甲者方 取瓜州礬石燒令沸定末敷之濕即刮却更著日數易即消散

實宣城縛云效亦主雞瘡有蟲有黃水若得吳白礬石亦佳若無雞矢礬亦好

又療甲疽瘡腫爛生脚指甲邊赤肉出時差時發者方 黃耆二兩 附子三兩 右二味切以苦酒浸一宿以

猪脂五合微火上煎取三合絞去滓以塗瘡上日三兩度其息肉即消散

出第四卷中

近效療甲疽瘡神妙方 重黃性平 蛇皮反燒 右二味等分更和研之 先以溫泔清浸洗瘡令軟以火

刀子割去甲角入內處裏乾取藥末栗許大以敷瘡上用軟綿裹之半日許藥濕即易之一日許即永

除其生痛者藥數乾一飯頃即宜痛定差訖一二日勿著窄靴鞋若能斷酒及猪雞魚蒜麴等其效愈

速其藥不過三四度永差

齋十四郎中有效

肉刺方二首

古今錄驗療肉刺方 好薄刮之以新酒醋和羊腦敷之一宿洗去常以綿裹之良

出第四卷中

近效療肉刺方 以黑木耳取貼之自消爛又不痛宜以湯浸木耳軟乃用之

手足皸裂方五首

深師療手足皸裂方 蜀椒四大合汗以水一升煮之七沸去滓漬之半食頃出令燥須臾復浸塗羊脂

髓腦尤妙

范注同出第十九卷中

集驗療手足皸裂血出痛方 若涉水霜凍面及手足皸裂瘡壞取麥蘗濃煮汁及熱以侵洗之即差

又方 取葱葉萎黃及穉者以漬洗之

范注

又療人脚無冬夏常折裂名曰尸脚此因履踏洗尸水及惡物故也方 取雞屎一升以水二升煮數沸

待小冷以漬脚半日不過三四度差

深師千金范注同出第九卷中

千金療手足皸裂血出疫痛方 猪胆著熱酒中以洗之即差

深師集驗同云無酒用湯亦佳出第二十四卷中

手足皸裂方五首

通陰脂音

甲後所起

細皮俗謂

倒刺前肉

刺發是一

類方中真

珠千金作

青珠

通按疣音

絲疣目目

尚德按也

目謂疣子

似目也

通按突疣
目普濟方
作臘款卷
點碎之
尚德按卷
千金作條

手足逆臙及瘰癧方二首

范汪療手足指逆臙方

真珠分乾薑分

右二味搗末以塗瘡指上日三千金案

深師療冬月冒涉凍凌面目手足瘰癧及始熱痛發瘰者方

蜀椒

芎藭俗名

白芷

防風

薑各一

鹽一作右五味以水四升煎令濃以洗之出第二十卷中

疣目方一十九首

肘後療疣目方

月晦日夜於廁前取故草二七莖莖研二七過粉疣目上訖呪曰今日月晦疣驚或明

日朝乃棄勿反顧之

又方 取亡人枕若席物以二七拭之亡人近溺易去也並出第

五卷中

集驗療去疣目方

七月七日以大豆一合拭疣目上三過訖使病疣目人種豆著南向屋東頭第二雷

中豆生四葉以熱湯沃殺疣目便去矣千金肘後

又方 取松柏脂合和塗其上一宿即不知處同

又方 作艾炷著疣目上灸之三炷即除范汪

千金同

又方 以石硫黃突疣目上六七過除千金同

尚德按干

千金去疣目方 取月十五日月正中時望月以瓦莖帚掃疣目上三七遍差止

又方 以豬脂瘰癧處搗之令少血出即差神驗不可加也

又方 以苦酒漬石灰六七日取汁點疣上小作瘡即落

又方 杏仁燒令黑研如膏塗之令差止

又方 以牛涎數塗之自落並出第二十四卷中

崔氏疣目方 取月盡日平旦并花水月生一日煮作湯竈突北面南自洗呪曰日盡水月初湯竈突非

千疣死百疣亡凡七度洗及呪甚良

又方 先布紙一張於牀上即以筆點疣一下遠點紙一下無間大小皆一一點每點即呪曰紙亦爛疣亦散點一遍訖乃深埋點紙於屋溜下久當疣散

又方 以蜘蛛網絲繞纏之自落良

又方 盜取一酸酒醋以厚疣上呪曰疣疣不知羞一酸酒醋洗你頭急急如律令呪滿七遍久即自愈

並出第
四卷中

張文仲療手足忽生疣目方 薤胡赤子按使壞疣目上塗之即去說注

又方 以鹽塗疣上令半抵之不過三度出第五
卷中

近效療疣子法 以墨塗之不過五度即差

又方 以屋溜下水塗疣上章略
事方

去黑子方二首

集驗去黑子及贅方 生藜蘆灰 生薑灰各五
升 石灰二升 右三味合和令調蒸令氣溜取甑下湯一

斗從上淋之盡湯取汁於鐵器中煎減半更關火煎以雞羽搔中即然斷藥成欲去黑子疣贅先小傷

其上皮令裁破以藥點之此名三灰煎秘方古今錄驗記注
同出第九卷中

救急去黑子方 夜以暖漿水洗面以布揩黑子令赤痛挑動黑子水研白梅檀取膿汁以塗黑子上旦

又復以暖漿水洗面仍以鷹屎粉其上出第三
卷中

疣贅疵黑子雜療方六首

深師反煎療瘤贅癰瘰癧瘰癧瘰癧等方 石灰五斗 濕桑灰 柞櫟灰各四
斗 右三味合九斗五

升以沸湯令氾沍調濕內甑中蒸之從平旦至日中遠取釜中沸湯七斗合甑三淋之澄清內銅器中

煎令至夜斟量餘五斗汁微火徐徐煎取一斗洗亂髮乾之如雞子大內藥中即消盡又取五色絲剪

如韭葉大量五寸著藥中亦消盡又令不强藥成以白矐子中貼之作藥時不得令婦人小兒雞犬臨

通按胡脈
疑是頭脈

通按連筋
子一本作

連筋子音

濟方中用

續隨子未

知是否

尚德按千

金巴豆十

五枚炭皮

二斤綿作

尚德按十

金云不耐

漆人不得

用以雞子

白和之

又按在二

以下六字

疑當大書

見之灰煎亦瘡癰驗其肉癰石癰藥敷之皆愈其血癰癰附左右胡脈及上下懸癰舌本諸陰處皆不可令消消即血出不止殺人不可不詳之

又瘡疣贅方

取連筋子熟時壞破之以塗其上便落

並出第二十九卷中

千金瘡皮中紫赤疵瘰癧方

乾漆

熱 雌黃

礬石各二兩

巴豆五十枚

炭灰一雞黃五兩 右六味為散以

雞子白和塗故綿貼病上日二易之即除

深師加莽草三兩餘

同出第二十四卷中

巴豆去心

礬石

各一

右七味為散以漆和

又瘡疣贅疵瘰方

雄黃 硫黃 真珠 礬石

熱 蘭茹

巴豆去心

礬石

各一

右七味為散以漆和

令如泥以塗貼病上項成瘡及去面上黑子點之即去

深師同出第二十四卷中

古今錄驗瘰癧子去疣等五灰煎方

石灰 胡藿灰 桑灰 炭灰 草灰

各一

右五味以水漚蒸

令氣匝仍取釜中湯淋取清汁五升許於銅器中東向龜煎之不得令雞犬小兒女人穢者見膏之成

好凝強如細沙糖即堪用量以點封之

出第五卷中

廣濟瘰癧贅赤黑疵瘰癧瘡疽息肉強結癰等神效灰煎方

炭灰三升湯拌令濕微以熱湯漬令半

日後還以湯淋之稍稍點湯不得太速下即灰汁不驗候汁下得三二升即內一小罐中煎令一兩沸

即別取一兩石灰風化者為佳恐中濕者須熱令極熱內灰汁中和煎以杖棗攪之勿住手候如煎餅

麪少許細細取成膏急瀉著一瓷器中攪令冷不然須更乾燥不堪用常候此煎十分有一分堪久停

但有傷損肉色須更變赤黑色痛如火燒狀若灸癰發破經二十餘日病自然脫落無癰痕欲衝風冷

逐行貼烏膏亦神效癰亦易落瘡未差間忌小豆薑外縱有癰亦不凸出烏膏

在二十四卷中

減癰瘰方一十七首

廣濟瘰癧人面癰瘰減之方

取白雞以油脂和水煮小麥令熟純以飼雞三兩日大肥安雞若版上作籠

籠之七日莫與雞食空飼清水七日取猪脂去脈膜切噉飼如食羹皆疑白開收煖水取塗癰上十度

平復舊欲用塗以羶葛布揩微赤離離訖然後塗之男女俱用效也

成瘰瘰方一十七首

下

下

下

又瘡人面及身瘡癰不滅方 鷹白糞 爛腐骨 尿白鹹各四麝香分 右四味研令如粉以葛布搗

令赤微離離以脂和敷之日二度差止 並出第五卷中

劉涓子六物滅癰膏方 衣中白魚 雞屎白 鷹糞白 芍藥 白欬 白蜂等 右藥研如粉以乳

汁和塗癰上日三良 出第五卷中

小品滅癰方 雞矢白一兩羊夷白附子 細辛各二 右四味酒浸一宿以羊脂六合微火煎三上三

下去滓傷癰以甘草洗訖塗之 心二方有桂

又方 鷹屎白一兩研白蜜和塗癰上日三 並出第十卷中

千金翼凡面皰瘡癰三十年以上并冷瘡癰瘰癧金瘡等方 斑貓 三枚去足翅 密陀僧 巴豆 三枚去心皮 胡粉兩

鵝脂 煎金釧洗沙 高良薑 去皮 海蛤 各三兩取中者 右八味為粉用鵝脂和夜半塗之旦以甘草湯洗之

差止 出第五卷中 按尚德釧與同金瘡也洗音叨清汰也

救急滅癰方 豬脂三斤飼烏雞令三日使盡收取白矢內白芷當歸各一兩煎白芷令黃去滓內鷹矢

白二分覺令調塗之旦洗之 千金同

又方 蒺藜子 山梔子仁各一 右二味為散醋漿和如泥臨臥時以塗之旦洗之 千金同

又方 痕凸出秋冬小麥麵春夏大麥麵下篩令細以酥和封之良 千金同

又方 夏以熱瓦熨冬以凍凌熨之 千金同 高德按千金自二方無夏冬二字

又方 鷹矢白兩白魚 一枚 右二味為散蜜和塗之日三即差 千金同

又方 鷹矢白 分 白蠟 蠶分 右二味研如粉白蜜和敷之日三差慎五辛肥膩生冷物 千金同

又方 臘月豬脂四升煎大鼠一枚令消盡以生布摩傷以塗之日四五過 千金同並出第三卷中

必效滅癰方 禹餘糧 半夏 右二味等分末以雞子黃和之先以新布拭癰上令亦以塗之勿令見

通接凍凌 即冰室中 之冰也夏 以凍凌疑 以熱瓦熨 以凍凌疑 以熱瓦熨 尚德按范 字下疑脫 汪字

風二十日滅矣十年癰無不愈平復如故 救急范 千金同

又療灸瘡及金瘡凡百瘡癰能令高者平下者起方

雞屎白

鷹屎白

各二合

辛夷仁

四分

白附子

杜若

各三細辛分

右六味下篩以赤蜜少少和先以布揩癰微破塗之日二差後忌五辛小豆油膩及酢

飲酒等若慎口味如大小淺深無不差

一本無杜若

桂心並出第四卷中

良

古今錄驗療面上癰減之方

白煙蠶

珊瑚

白芷

雞矢白

硃砂

略研

右五味搗蜜和敷之尤

良

又方

木蘭香一斤以三歲米醋浸令沒百日出暴乾搗末以塗之一方用醋漿水浸百日出暴乾末服

方寸匕日再

出第三卷中

唐王燾先生外臺祕要方卷三十目錄

惡疾大風癰瘡等二十三門

惡疾大風方一十首

諸癰方九首

烏癰方一首

白癰方五首

十三種丁腫方一十三首

丁腫方二十首

犯丁腫重發方二首

惡腫一切毒瘡腫方一十八首

反花瘡及諸惡瘡腫方四首

魚臍瘡方一十首

丹毒方九首

赤丹方五首

白丹方一十三首

丹癰方四首

赤癰白癰方一十一首

肺風冷熱癰方二首

雜丹癰毒腫及諸色雜瘡方五首

癰瘡方一十二首

癰瘡久不差方五首

癰瘡方一十一首

乾濕癰方一十五首

疥癬惡瘡方五首

疥風痒方七首

尚德按腫
字疑衍

唐王惠先生外臺祕要方卷三十

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

惡疾大風方一十首

通按卒不作瘡千金作手下手作

千金論曰惡疾大風有多種不同初得雖遍體無異而眉鬚已落有遍體已壞而眉鬚儼然有諸處不異好人而四肢腹背皆有頑處重者手足十指已有墮落有患四體大寒而重裘不暖而有尋常患熱不能暫涼者有身體枯槁者有津汗常不止者有身體乾痒徹骨搔之白皮如髮卒不作瘡者有瘡癩荼毒重疊而生晝夜痛不已者有直置頑鈍不知痛痒者其色亦有多種有青黃赤白黑光明枯闇此疾雖種種狀貌不同而難療易療皆屬在病人不繇醫者何則此病一著無問賢愚皆難與語口順心違不受醫教直希望藥力不欲求己故難療易療屬在病人不關醫藥臣嘗手瘡六百餘人差者十分有一莫不一一親自撫養所以深細諳委知其情性若覺難共語不受人教即不須與療縱與瘡終有觸藥力病既不差乃勞而無功也仁者易共語故可瘡也

尚德按千金乃作及拏作拏

又按多千金作適

又論曰神仙傳有數十人皆因惡疾而致仙道者何皆繇割棄心累懷顙陽之風所以非止差病乃至因禍而取福也故臣所觀病者其中頗有士大夫乃至有異種名人乃遇斯患皆戀愛妻拏繫著心髓不能割捨直望藥力未肯近求諸身若能絕其嗜慾斷其所好非但愈疾因茲亦可自致神仙嘗問諸病士人皆云自作不仁之行久久並為極猥之業於中仍欲更作云為雖有悔言而無悔意但能自新受師教命餐進藥餌何有不除臣以正觀中嘗將一病士入山教服松脂欲至百日鬚眉皆生由此觀之唯須求之於己不可一仰醫藥者也然有人數年患身體頑癢羞見妻子不告之令知其後病成狀候分明乃云卒患此皆自謬然斯疾也雖大治之於微亦可即差此疾一得多者不過十年皆死近者五六歲而亡然病者皆自謂百年不死深可悲悼

又論曰一遇斯疾即須斷鹽常進服松脂一切公私物務釋然皆棄猶如脫屣凡百口味特須斷除漸漸斷穀不交俗事絕乎慶吊幽隱巖谷周年乃差差後終身慎房室犯之還發茲疾有吉凶二義修善則吉若還同俗類必是凶矣今略述其繇致以示後之學者可覽而思焉

又崗豆瘡惡疾方 細粒烏豆擇取摩治之去有皮不落者三月四月取天雄烏頭苗及根淨去土勿洗搗絞取汁漬豆一宿豆如熟豆大漉出暴乾如此七度始堪服每服三枚漸加至六七枚日一忌房室

又岐伯神散瘡萬病癰疽疥癩風癢骨肉疽敗百節疼眉毛髮落身體淫淫躍躍痛痒目痛爛背耳聾齒疳瘰等方 天雄皮去附子皮去細辛 烏頭皮去茵芋炙各乾薑 石南 芎藭 防風略白朮

獨活各三躑躅兩椒兩防葵兩枳實二兩右十五味搗散以酒服方寸匕日三勿加

又瘡惡疾狼毒散方 狼毒炙秦苑 右二味等分為散酒服方寸匕日二服五十日愈切須忌慎

又方 松脂鍊投冷水中二十遍杵末蜜丸服二兩饑即服之日三鼻柱斷離者二百日差斷鹽及雜食

又石灰酒主生髮毛長鬚眉去大風方 松脂成鍊者黍米一石拌和濕上麴一石右四味先於大鐺中炒石灰以木著灰中火出為度拘杞根剉五斗以水一石五斗煮取九斗半去滓以淋石灰

三遍澄清以石灰汁和釀漬麴用汁多少一如釀法訖封四七日開飲一二升常令酒氣相及為度百無所忌不得觸風其米泔水及飯糟不得使六畜犬鼠食之皆須令深埋却此方九月作至二月止恐

隔上熱服後進三五口冷飯壓之婦人不能食飲黃瘦積年及褥風不過一石即差

又療風身體如蟲行方 鹽一斗水一石煎減半澄清溫洗浴三四遍亦療一切風

尚德按千金名岐伯神聖散各薑石南乾一兩通按千金此方無防葵枳實二味尚德按千金日三服尚德按兩千金作九尚德按拌字下千金有字字又按千金無半字法字上有酒字

又按陽疑當作陽疑又按陽疑金作陽疑通按陽疑純此音譯

尚德按高音純清也又

沃清也
尚德按千

金云洗頭
髮不淨加

少麵
尚德按千

金日三服

通按床風

二字疑誤
兩人共服

一劑即服

半劑

尚德按或

於病源作

或在

通按既音

刺有毒蟲

尚德按病

源無於字

又方 成鍊雄黃松脂等分蜜和丸以飲服十九丸如桐子大日二百日差慎酒肉鹽豉生冷生血物等

神祕不傳出第二十卷中

近效婆羅門僧療大風疾並壓丹石熱毒熱風手脚不隨方 硝石一大生烏麻油二大 右二味內鑊

中以土鑿蓋口以紙泥固勿令氣出細細進火煎之其藥未熟氣腥候香氣發即熟更以生烏麻油二

大升和之更微火煎之以意斟量得所訖內不津器中服法患大風者用火為使在室中重作小紙屋

子屋子外然火令病人在紙屋中發汗日服一大合病人力壯日二服服之三七日頭面庖瘡皆滅若

服諸藥丹石熱發不得食熱物著厚衣卧厚牀林風者即兩人共服一劑服法同前不用火為使忌風

二七日或但取一匙內口待消咽汁熱除忌如藥法呂員外處得

諸癰方九首

病源凡癰病皆是惡風及犯觸忌害得之初覺皮膚不仁或淫淫苦痒如蟲行或目前見物如垂絲或癰

癰輒赤黑此皆為疾之始起便急療之斷米穀着鮭專食胡麻松朮輩最善也夫病之生多從風起當時

微發不將為害初入皮膚之裏不能自覺或流通四肢潛於經脈或於五藏乍寒乍熱縱橫脾腎蔽諸毛

腠理壅塞雖通因茲氣血精髓乖離久而不療令人頑痺或汗不流泄手足酸疼針灸不痛或在面目習

習奕奕或在胸頸狀如蟲行或身體偏痒搔之生瘡或身面腫痛徹骨髓或頑如錢大狀如蛇毒或如梳

或如手錐刺不痛或青黃赤黑猶如腐木之形或痛無常處流移非一或如酸裏或若懸鈴或似繩縛拘

急難以俛仰手足不能搖動眼目流腫內外生瘡小便赤黃尿有餘瀝面無顏色恍惚多忘其間變狀多

端毒蟲若食人肝眉睫墮落若食人肺鼻柱崩倒或鼻生息肉塞孔氣不得通若食人脾即語聲變散若

食人腎耳鳴啾啾或如雷鼓之音若食人筋脈支節墮落若食人皮肉頑痺不覺痒痛或如針錐所刺名

曰刺風若蟲乘風走於皮肉猶若外有蟲行復有食人皮肉徹外從於頭面即起為皰肉如桃核小棗從

又按崇疑
當作祟
又按病源
二作三
字下有
不

時或如榆莢或如錢孔或青或白或黑或黃變易無定或起或滅此等皆病之兆又云風起之繇皆是冷熱交通流於五藏徹入骨中虛風因濕和合蟲生便即作患論其所犯多因用力過度飲食相違房室太過毛孔既開冷熱風入五藏積於寒熱寒熱之風交過通徹流行諸脈急者即患緩者稍遠所食穢雜肉蟲生日久冷熱至甚暴蟲遂多食人五藏骨髓及於皮肉筋節久久皆令壞散名曰癩風若其欲療先與雷丸等散服之出蟲見其蟲形青赤黑黃白等諸色之蟲與藥療者無不差然癩名不一木癩者初得先當落眉睫面目痒如復生瘡三年成大患急療之愈不瘡患成火癩者生瘡如火燒瘡或斷肢節七年落眉睫急療可愈八年成疾難可瘡金癩者是天所為也負功德崇初得眉落二年食鼻鼻柱崩倒巨瘡良醫能愈土癩者作病身體塊磊如雞子彈丸許此病宜急療之六年成大患十五年不可瘡水癩者先得水病因即留停風觸發動落人眉鬚急療之經年病成蟋蟀癩者如蟋蟀在人身體內百節頭皆欲血出三年巨瘡癰癰者蟲出如麤舉體艾白難瘡重藥可愈多年巨瘡白癩者斑駁或白或赤眉鬚墮落亦可瘡之多年難瘡疥癩者狀似癰瘡身體狂痒十年成大患可急療之愈風癩者風從體入或手足刺瘡風冷痺癰不瘡二十年後便成大患急療之愈蚰癩者得之身體沉重狀似風癩可瘡之至久積歲成大患疾速瘡之酒癩者酒醉臥黍稷上因汗體虛風從外入落人眉鬚令人惶懼小瘡大愈養生禁忌云醉酒露卧不幸生癰也又云魚無鰓不可食食之令人五月發癰

出第二
卷中

肘後凡癰病皆起於惡風及觸犯忌害得之初覺皮膚不仁淫淫若痒如蟲行或眼前見物如垂絲或癰癰赤黑氣滯沉此皆為疾之始便急瘡之此疾乃有八九種大都皆須斷米穀鮭者專食胡麻松朮最善別有蠻夷酒決疑丸諸大方數首亦有符術令只取小小單方 苦參五斤 右一味以好酒三斗漬四

五日稍稍飲之二三合

備急同本
方療白癰

又方 苦參根皮斤

右一味麤搗以酒三斗漬二十一日去滓服一合日三若是癰疾即應覺痺禁雜

食

通按指一本作背

通按蓮荷未詳

尚德按並字疑衍

范汪療癩方 取馬新蒿一名馬矢蒿一名爛石草搗末服方寸匕日三百日如更赤起一年都差平復

同肘後

又方 炙兩手約指中理左右及手足指虎口中隨年壯

深師療癩身體面目有瘡必死方 取白艾蒿十束如升大煮取汁釀米七斗一如釀法酒熟稍稍飲之

又方 水銀研蘭茹 藜蘆 真珠研丹砂研雄黃研 右六味各一斤皆研如粉以三歲苦酒三石五

斗於瓮中漬諸藥令耗七日於淨溫密室中漬浴始從足漸至腰浸之日一以綿拭面目訖以水洗兩

目勿令入目也可七日為之勿令冷神效忌狸肉生血等

同范汪

又療通身癩瘡方 蓮荷二十枚石灰一斗淋取汁合煮令極濃以漬瘡半日許可數為之

尚德按李時珍本草引聖

惠方用荷葉三十枚

又方 取水中浮萍青者一秤濃煮以漬俗半日用此方多愈

並出第九卷中

集驗療癩方 取葎草一擔以水二石煮取一石以漬洗瘡不過三五度差

烏癩方一首

病源夫癩病皆是惡風及犯觸忌害所得初覺皮毛變異或淫淫若痒如蟲行或眼前見物如垂絲言語

無定心常驚恐皮肉之中或如桃李隱癰赤黑手足頑痺針刺不覺痛脚下不得踏地凡食之時開口而

鳴語亦如是身體瘡痛兩肘如繩縛此名黑癩

出第二卷中

集驗烏癩白癩丸方 狢皮炙魁蛤 蝮蛇頭炙木蠹炙 蝨蟲炙 蟻蠃各一枚 陵鯉甲去頭葛上

亭長炙斑猫去翅足蜈蚣去頭附子各三枚 蜘蛛炙水蛭一枚 雷丸三十枚 巴豆十五枚去水銀研大

黃真丹桂心射罔各一黃連分石膏研二蜀椒分芒硝研龍骨分三甘遂熬礬石燒滑石各

分 右二十八味搗篩蜜和丸如胡豆服二丸日三加之以知為度忌猪肉冷水生葱此方分兩多不

同為是古方傳寫差錯若臨用時即以意量之

一方有七蟲無木蠹斑猫蜈蚣蛇

蛇作蟬蛇范汪同出第八卷中

白癩方五首

病源凡癩病語聲嘶破目視不明四肢頑痺肢節火然一作大熱心中煥熱手足俱緩背脊至急肉如遭劈身

體手足隱癢起往往正白在肉裏鼻有息肉目生白珠當腫子視無所見此名白癩出第二卷中

集驗療白癩釀酒方 苦參斤露蜂房五兩 右二味切以水三斗法麴二斤和藥漬經三宿絞去滓炊黍

米二斗釀準常法作酒候酒熟壓取先食一飲一雞子日三稍稍增之以差為度一云亦癩風癰惡瘡時後同出第八卷中

范汪療在身白屑虛搔之或呼作白癩方 苦參五兩露蜂房五兩 狝皮一具 麴三升 右四味切以水三

斗五升合藥漬四宿去滓炊米二斗釀如常法酒熟食後飲三五合漸增之以知為度

千金療白癩大風眉鬚落赤白癩病八風十二痺筋急肢節緩弱飛尸遁注水腫癰疽疥癬惡瘡腳掌手

折眼間血淋痰飲宿癖寒冷方 商陸根二十五斤如馬耳薄切之 麴二十五斤 右二味以水一斛漬之炊黍

米一石釀之如家造酒法使麴末相淹三醖之訖封三七日開看麴浮酒熟澄清溫服之至三斗稍輕

者二斗藥發吐下佳宜食粥飯牛羊鹿肉羹忌生冷酢滑猪肉魚雞犬肉等物出第二十卷中

文仲療白癩方 乾艾葉濃煮以漬麴作酒如常法飲之令醺醺姚氏范汪同

又方 大蝮蛇一枚乾者并頭尾全勿令欠少以酒漬之大者一斗小者五升以糠火溫令酒盡稍稍取

蛇一寸許以臘月猪膏和傅瘡上忌小麥熟麴附後范汪同並出第五卷中

十三種丁種方一十二首

千金論曰夫稟形之類須存攝養將息失度百病萌生故四時代謝陰陽遞興比之二氣更相擊怒當其

時也必有暴氣夫暴氣者每月必有卒然大風大霧大寒大熱若不將避人忽遇之此皆入人四體頓折

皮膚流注經脈遂使腠理擁隔榮衛結滯陰陽之氣不得宣瀉變成癰疽丁毒惡瘡諸腫至於丁種若不

預識令人死不旋踵若著訖乃欲求方其人已入木矣所以養生之士須早識此方凡是瘡瘍無所逃矣

又一曰麻子丁其狀肉上起頭大如黍米色少烏四邊微赤多痒忌食麻子及衣麻布并入麻田中行二

尚德按癰 疑當作癰 尚德按丁 種疑當作 丁腫二疑 當作三 又按比之 二氣四字 千金作此 無疑當據 外臺作氣 又按千金

尚德按開 血淋千金 作開洞洩 又按千金 溫服三升 輕者二升

又按千金
牛作羊半
作評

又按千金
取二升

一 右六味各搗篩乃秤之合和攪令相得先取伏龍肝九升末之以清酒一斗二升攪令渾渾澄取清二升和藥捻作餅子大六分厚二分其濁滓仍置盆中布餅子於籠上以一重紙藉盆上以泥酒氣熏之仍數攪令氣發經半日藥餅微乾乃內瓦坩瓶中一重紙一重藥遍布勿令相著密以泥封之三七日乾以紙袋貯乾處舉之用法以針刺瘡中心深至瘡根并刺四畔令血出以刀刮取藥如大豆許內瘡上若病重困日夜三四度輕者一二度著重者二日根爛始出輕者半日一日爛出當看瘡浮起是根出之候若根出已爛者勿停藥仍著之藥甚安穩令生肌易其病在口咽及胸腹中者必外有腫異相也寒熱不快疑是此病即以飲或清水和藥如二杏仁許服之日夜三四服自然消爛或以物剔吐根出即差若根不出亦差當看精神自覺醒悟合藥以五月五日為上七月七日次之九月九日臘月臘日皆可若急須藥他日亦得要之不及良日也修合須清淨燒香不得觸穢毋令孝子不全之人及產婦六畜雞犬等見之凡有此病忌房室猪牛雞魚生韭蔥蒜芸薑胡荽醋麪等若犯諸忌而發動者取枸杞根湯和藥服並如後方前二家方本是一家智者平論以為後方最是真本其病通忌酒肉五辛芸薑胡荽油麵生冷酢滑耳

後方如左

崔氏

白礬石

五兩

牡蠣

十兩

枸杞根白皮

四兩

茯苓

三兩

右四味細篩合和先取新枸杞根切

六升水一斗半煮取五升去滓內狗屎二升攪令調勻澄取清和前藥敷搗捻作餅子陰乾取兩刀針當頭直刺瘡痛徹拔出刮取藥末塞孔中拔針出即內藥勿令歇氣并遍封瘡上頭即脹起針挑根出重者半日以上即出或已消爛挑根不出自差勿憂之其病在內者外當有腫相應並皆惡寒發熱疑有瘡者以水半盞刮取藥如梧子五枚和服之日夜三四服外自消也若須根出服藥後一日以上以雞羽剔出根縱不出根亦自消爛在外者亦日夜三四遍敷藥根出後常敷勿休生肉易差若犯者取枸杞根切三升以水五升煮取三升去滓研藥一錢匕和枸杞汁一盞服之日二三服并單飲冷枸杞汁三盞彌佳

尚德按紋
字下千金
有白字

尚德按子
金根莖苗
子但取一
色
尚德按子
金其作家
無子振二
字
尚德按子
金每飲一
斗

尚德按口
金作口中
類邊
通按千金
神心昏昧
下口乾
心煩即死
也七字無
不可具論

又以狗犯汁絞狗屎取汁服之最良合訖即用不必待乾所言白狗屎是狗食骨其尿色如石灰故直言狗白屎也如預造取五月五日七月七日臘日合者其用療病尤良但有人卒患喉中痛乍寒乍熱者即是其病當急以此藥療之腹中無故而痛惡寒發熱者亦是此病前二方同是一方法用一同是主癰疽_{同昇}

又方 以針刺四邊及中心塗雄黃立愈_{一云塗黃土}

又方 馬齒菜_{石灰} 右二味和搗以雞子白和塗之_{文仲備急等同出第二十三卷中}

又療一切丁腫方 取蒼耳根莖子等燒作灰以酢泔澆和如泥塗上乾即易不過十餘度即拔根出

又論曰臣以正觀四年忽口右角患丁腫造甘子振其子振每為貼藥十日不差臣以此療之一如方說自是常作此方以救諸人未說有不愈者故特論之以傳後世丁腫方殆有千首皆不及齊州蔡姓方亦

不勝此物造次易得也

又方 飲鐵漿一碗即差

又方 蒺藜子一升作灰以醃醋和封塗瘡上一宿差

又方 皂莢子中人末敷之數貼五日愈

又論曰凡癰丁腫皆刺中心至痛又刺四邊十餘下令血出去血後敷藥藥氣入針孔中佳若不達瘡裏

則不得力也

又論曰其腫好著口邊頰中舌上赤黑如珠子疼痛應心是寒毒久結變作此疾不即療日夜根長流入

諸脈數道如箭入身捉人不得動搖若不慎口味房室死不旋踵經五六日不差眼中火光生心神昏昧

不可具論此其狀也_{並出第二十三卷中}

備急療丁腫姚方云丁毒為瘡肉中突起如魚眼狀赤黑疼痛是寒毒之結變作此疾始作服湯及如瘡

丹法便差又支太醫云有一十三種丁瘡其狀在大方中初起皆患寒熱又三十六丁亦是十三種數內

或今日生一明日生二或生三或生十滿三十六丁皆療之方 蛇皮炙末和鼠矢以針刺破瘡內中即

拔出差止同文仲

又方 取人糞乾者末之挑腫破敷瘡大良若犯瘡未死者開口灌廁清一大升須臾立差

又方 取白馬牙齒燒作灰先以針刺瘡令破以灰封之用麵周匝圍之候腫軟用好酢洗却灰其根即

出當便差

又內令消神驗方 反勾棘針三十二枚一生大豆黃四十枚緋頭帶三條亂髮三雞右四味作三

分先將緋一片裹棘針豆黃各三十枚用髮一塊纏緋令周匝牢固又取兩段緋各如法裹之訖各於

炭火上燒令烟盡且以兩段於瓷器中熟研之和酒半盞空腹服之半日瘡四邊軟內舒適即差半日

不覺可更服一段必差若後犯之有三五豆赤黑膿出不經犯者十八日即差此方甚效勿犯之

丁腫方二十首

廣濟療丁腫毒氣敷藥差方 白馬牙燒令赤肉米醋中更燒附子生用雄黃研半夏 右四味各等分為末以臘月

猪脂和如泥封腫上一兩遍即差先以針刺至痛處後可封藥即效

又方 爛棘刺三枚反勾者丁香七枚並燒令煙斷以末滿月孩子糞和塗腫上頻頻三兩度根爛差

又方 車輻軸脂 白鹽 蕪菁根 釜底墨等分 右四味等分為末和以臘月猪脂敷上以醋及水亦

得

又療丁腫封藥後宜常服散方 亂髮雞子大反勾棘針爛者二升露蜂房 蛇脫皮各一絳緋尺 右五味分

作五分以緋裹之用麻急纏之於炭火上燒如煙欲斷即收勿令作白灰末以酒和空肚服方寸匕日

二夜一差止

又方 半夏生用石灰等分 右二味搗末以敷瘡上並出第

備急療丁腫方 乾薑 胡椒 龍骨 斑猫去翅足皂莢炙去皮 右五味各等分搗篩以酒和封瘡上日

尚德按等
分二字疑
衍

通按導音
須即今織
預也
尚德按且
疑當作旦

尚德按
疑當作
後同

一敷之

又方 以針刺破瘡頭取熱人糞塗上乾易之不過十五遍即出又以礪砂封上若毒入腹以枸杞根切煎服之如犯觸亦然

又方 露蜂房 曲頭棘刺七枚 蒼耳子七枚 緋一亂髮雞子 腐蒿草節二七 右六味熬令黑末研硃砂

少許和酒服方寸匕日三服後加酒令微有酒色禁食如常療肉腫彌佳文仲

又方 斑蝥一枚捻破然後以針畫瘡上作米字以封上根乃出也

又方 生大豆黃三十二枚 緋頭帶五寸 亂髮雞子 右三味以緋裹亂髮牢纏於炭火上燒得黑

烟欲盡即出之冷瓷器中研如粉以酒空腹服之方寸匕平明至午時覺四體舒通覺瘡輕即差如未依前服之差止若犯之瘡即出膿血未經犯六七日平貼忌如常法

必效療丁瘡方 取舊廁清絞取汁青竹茹燒作灰 右二味研和清攪一百遍稀稠成膏刺瘡四邊令

遍先以唾和麵圍瘡四面寫藥漸漸令滿其中仍三五度換之晬時瘡即爛以針挑之拔去根即差止未出更著之神效

又方 蜂窠七枚 真緋手掌 亂髮拳 右三味各燒為灰作末酒一小升和頓服之差止未差更作之並出

第六卷中

古今錄驗療丁腫方出徐 大黃 秦艽 藜蘆 石硫黃研礪砂各一兩 右五味搗篩為散以刀子頭

取和冷水量瘡大小封之若腫大闊可作五香湯服之并取麵和塗腫上乾即易之差止一方無大黃

面麵糊紙貼勿令乾數著也

又方 白馬齒 亂髮 麝各一 枸杞白皮三 右四味燒作灰以酒和服方寸匕不差至二匕

又方 曲頭棘刺四百枚 橘皮三兩 右二味以水三升煮取半升服一合塗腫上亦得

又方 取磁石搗為粉驗醋和封之立拔根出

惡腫一切毒瘡腫方一十八首

又方 五月五日取壯狗矢燒作灰敷瘡數易之一作按壯

又方 巴豆二七枚去皮半夏二七枚搗末以寒食餚和之以針刺瘡四邊即以藥塗之立拔出以澤瀉

末填瘡孔中便差侍即崔世讓送

又方 蛇脫皮燒四分露蜂房灰一髮灰分 右三味並用五月五日採燥之相和以新瓦碗內燒灰白飲

服漿許大令汗出未汗更服以汗為度七日不得食鹽酒肉五辛房室生冷醋滑等不得食蝟肉雞肉

食者難差蛇皮不得帶赤色有毒純白者上此高機奴法

又方 亂髮子許雞緋帛寸三曲頭棘刺七七枚東蒼耳三枚 右四味合燒作灰研成散每以水半盞許服

方寸匕日二三差止慎風熱餘忌同前慮有犯觸加慶用一方寸鼈甲三方寸蜂房三寸三物等分燒

灰為散若有犯者依前方服之甚效並出第三十卷中

犯丁腫重發方二首

廣濟療丁腫犯之重發方 青羊糞升 右一味以水二升漬少時煮兩沸絞取汁一升頓服無所忌出

五卷中

古今錄驗療犯丁腫方 枸杞白皮一方麥燒麻子燒灰各緋帛一方寸勾頭棘子二七枚亂髮灰半

夏一七枚大小如羊糞者熱令黃 右七味藥不問冬夏悉須溫酒和服多少任人性此方無所忌不宜犯麻子多致

死晉熙公上出第三十卷中

惡腫一切毒瘡腫方一十八首

廣濟飛黃散療諸惡瘡腫方 曾青 雌黃 白礬石 磁石 雄黃 丹砂各一 右六味各細研依

四方色以藥置色處曾青東方丹砂南方白礬石西方磁石北方雄黃中央瓦甕二枚以黃泥下再三

過使厚五六分以雌黃屑著下合篩諸藥著上後以半雌黃屑覆上以泥密塗際勿令氣泄土須厚一

宿如常點火點火用二年陳蘆作樵中調火以新布沈水中覆釜上乾復易九十沸止若日暮七十七

通按此方用法且疑有缺文

尚德按項
無當作項

尚德按
急變痛千

金作疼痛
急

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

尚德按
急變痛千

沸亦足止太熟一斛米飯項發出藥惡肉青黑乾不復出汗愈無變以土釜二枚如上法也第二十四卷緩症中

有比方更有石英石膏礪乳雲母為十味出第三十一卷中

千金瘡惡毒腫或著陰卵或偏著一邊疼急變痛牽少腹不可忍一宿殺入方 苗香苗 右一味搗取

汁飲一升日三四服其滓以貼腫上冬中根亦可用此外國神方從永嘉以來用之起死神效又按此方第三

十七卷中亦引之永嘉作元嘉永嘉晉懷帝年號元嘉劉宋文帝年號未詳孰是千金今本作永嘉尤誤永嘉明太宗年號

又凡風勞毒腫疼變痛或牽引少腹及腰膝痛方 桃仁一升去尖皮兩仁熬令黑煙出熟搗研如脂膏

以酒三升攪令相和服覆取汗不過三差甚妙

又大麻子小豆湯主毒腫無定處或雷雷惡寒或心腹刺痛煩悶者此由毒氣深重也方 射干三商陸

薄切赤小豆升麻子升附子三兩 右六味切以水二斗煮麻子取一斗半去滓研麻子令破

以麻子汁煮藥令豆極熟去滓可得六七升一服一升日夜令盡小便當利大下即毒腫氣當減食此

豆益佳如湯沃雪也出第二十卷中

崔氏五香湯療毒腫方 麝香研 青木香 雞舌香 藿香 薑陸香 當歸 黃芩 升麻 芒硝各

分大黃分五 右十味切以水六升煮取二升去滓入芒硝令烱分為二服相去六七里久亦瘡諸卒尸

注惡氣也

又瘡惡腫犀角湯方 薑陸香 青木香 雞舌香 藿香 犀角各二 沉香分二 升麻分七 右七味切以

水六升煮取二升半去滓分三服其間消息以意量之出第五卷中

又烏膏療一切瘡引膿生肌殺瘡中蟲方 烏麻油清者一升生 黃丹二兩 薑陸香一兩乳 松脂 蠟各半

右五味先空煎油三分減一停待冷次內黃丹更上火緩煎又三分減一又停冷次內薑陸香末不冷

即恐溢沸出煎候香消盡次下松脂及蠟膏稍稠即以點鐵物上試之斟酌硬軟適中乃罷先問所

患瘡是熱即減薑陸及松脂若瘡如久不差此涉於冷依方煎之其貼杖瘡者油若一升地黃汁半合

黃丹二大兩蠟一小兩餘準上法此膏不須硬

出第二卷中

必效療惡瘡方 熱毒腫以灸近下鑽孔盛水令水射腫又以雞子清封腫上熱即易之

又方 取芫蔚臭草搗汁服一雞子許渾封腫熱則易之甚良

又方 搗地松汁服之每日兩三服即差止

又方 大黃 石灰 赤小豆各等分 右三味搗末以苦醋和塗之效

出第四卷中

經心錄療諸毒腫升麻膏方 升麻三兩 白斂 漏蘆 連翹 芒硝各二兩 黃芩 蛇銜各三兩 蒴藋根四兩

梔子二十枚 枳實二兩 右十味搗碎以酒浸半日以猪膏五升煎之膏成去滓以器盛有毒熱腫取塗貼

上摩之即消散日三小品

又大滄漬腫毒升麻湯方 升麻兩 黃芩三兩 梔子二十枚 漏蘆二兩 蒴藋根五兩 芒硝二兩 右六味切以水一斗

煮取七升候冷分用漬滄腫常令濕潤即消

小品集驗同

又漏蘆湯方 漏蘆無用梔子 白斂 黃芩 麻黃 白薇無用知母 枳實炙 升麻無用犀角 芍藥 甘草炙各二兩 大黃三兩

尚德按白斂千金作白發

芒硝 右十味切以水一斗煮取三升分三服若無藥處單服大黃一兩取利忌海藻松菜等千金云一切

柳小品亦治丹毒並出第五卷中

近效療一切熱毒腫驗方并主乳癰 青木香 紫葛 紫檀 朴硝各二兩 赤小豆一合 蜀升麻 白斂

生礬石各一兩 右八味搗篩以水和如稀麵糊又以榆皮汁和之亦佳以布剪可腫大小仍每斤剪三

兩個小孔子塗藥貼腫上乾即易之

王度支處

又貼毒熱腫消方 蔓菁根 芸薹苗葉根各三兩 右二味搗以雞子清和貼之乾即易之當日消

又方 商陸根 芸薹苗葉根等分 右二味搗之依上方貼之效

又療一切熱瘡腫硝石膏方 硝石一斤 生麻油升三 右二味先煎油令黑臭下硝石緩火煎令如稠餲膏

成以好瓷器中收貯以塗貼瘡腫或熱發服少許妙用好酥煎更良忌生血物

反花瘡及諸惡瘡方四首

病源反花瘡者由風毒相搏所為初生如飯粒其頭破則血出便生惡肉漸大有根濃汁出肉反散如花狀因名反花瘡凡諸惡瘡久不差者亦惡肉反出如反花形也

出第三十五卷中

千金療一切久不差諸惡瘡兼反花瘡大神驗方 鼠粘子草根細切熟搗和以臘月猪脂封貼腫瘡上

取差止

出第二十卷中

必效療反花瘡方 柳枝葉以水煎成膏和稠錫塗之良

又方 取馬齒草燒灰敷之頻貼差止

千金同

又方 鹽灰敷之神驗

並出第四卷中

魚臍瘡方一十首

千金療魚臍瘡似新火針瘡四邊赤中央如欲黑色可針刺之若不痛即可畏也方

亦名魚臍丁

臘月魚頭

灰以亂髮灰等分以雞稀溲尿和令相得封瘡上頻貼差止此瘡見不足言而能殺人

又方 以寒食餚封之又硬者燒灰塗貼敷之即差

又瘡魚臍瘡其頭白似腫痛不可忍者方 先以針刺瘡上及四畔作孔擣白芷取汁滴著瘡孔中如無

以乾白芷末用敷

白芷一云

又方 本方云赤根丁瘡 取鼈鼠壤土以水和如泥塗貼上熱則易之差

又方 馬牙齒擣末以臘月豬脂和塗之拔根出即止亦燒灰用

又方 本方云瘡犯丁瘡 刺瘡頭及四畔令汁極出擣生粟黃敷上以麵圍之勿令黃出自旦至午必出

又方 上同 以麵圍瘡如前法以針亂刺瘡上及四畔取銅器煎醋令沸瀉著麵圍中令容一盞冷即易之

不過三度即拔根出

又方 上同 以水四斗煮蛇脫皮如雞子大三四沸去滓服之立愈又燒蛇皮灰以雞子清和塗上差

並出第二

十三
卷中

崔氏療魚臍毒瘡腫方 瘡初生之時頭白如黍米許大當中黑如蟻四畔赤至四五日之後疼痛不可

忍似潰不潰雖至潰破膿出迴轉還滿疼痛不止者便是其候取獺屎以水和封腫處及瘡上即得膿

出止痛消腫慎口味與患丁腫同千金

又方 取瞿麥和生油熟搗塗之亦佳並出第
五卷中

丹毒方九首

肘後夫丹者惡毒之氣五色無常不即療之痛不可堪又待壞則去膿血數升或發於節解多斷人四肢

蓋疽之類療之方 煮栗膠有刺者洗之同姚

又療發足蹠方 搗蒜如泥以厚塗乾即易之集驗文仲備急
同出第二卷中

小品說丹毒一名天火也肉中忽有赤如丹塗之色大者如手掌其劇者竟身體亦有痛痒微腫方 赤

小豆升 右一味末下篩以雞子白和如泥塗之乾復塗之遂手消也竟身者倍合之盡復作刪繁千
金同

又療丹諸單行方或得一物差 水苔 生蛇銜 生地黃 生松葉 蒴藋葉 五葉藤 慎火草

浮萍草 豆鼓 大黃 梔子 黃芩 芒硝 右十三味但得一物搗以貼之即差赤小豆末和雞

子白塗無雞子水和用之千金

又方 新附淋草半斤蛇退皮一條露蜂房三兩 右三味以水一斗煮取四升以帛搗洗之隨手消神妙經用

效故附此卷傳之

又方 煮粟取濃汁以洗之妙

又方 取曲蟥糞水和如泥塗之

千金論曰丹毒一名天火肉中忽有赤如丹塗大者如手掌甚者竟身痒微腫又白丹肉中起痒痛微虛腫如吹癰癰起亦有雞冠丹赤起大者如錢小者如麻豆粒如雞冠上澀一名茱萸火丹有水丹由體熱

張湯以腴 莖也發即 尚德按李 時珍本草 藥樹皮下 孟說云治 丹毒五色 無常刺皮 有刺者煎 水洗之時 珍云出肘 后方 通按豆豉 千金作豆 葉 通按新附 淋草一作 新浮萍草 通接雞冠 上澀即雞 冠上累累

如粟之狀也此條與千金文仲異
尚德按千金黃芩二兩梔子四十枚
又按種千金作諸
通按千金
若養菜黃
尚德按三
千金作二

遇水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在中喜著腹及陰處此雖小疾不治令人至死瘵之皆用升麻膏
尚德按千金起痺痛作腫起瘵而腹腹痛作散 升麻 白薇 漏蘆 連翹 芒硝各二兩 黃芩 蛇銜 枳實各三兩 梔子十二枚

兩

右十味搗碎令細以水三升漬半日猪脂五升煎之候水氣竭去滓乾器中收之量取數

丹毒上頻塗敷之以差止凡種丹及熱瘡腫皆用之效忌如常內宜服漏蘆湯文仲備急集驗無白薇崔氏同

又療丹神驗方 芸薹菜黃搗令熟厚封之隨手即消散餘熱未愈再封臣以貞觀七年三月八日於內

江縣飲多至夜睡中覺四體骨肉並疼比至曉頭痛目眩額左角如彈子大腫痛不可得近至午時近

右角至夕諸處皆到眼遂閉合不暫開幾致殞斃其縣令周公以種種方藥治皆不差經七日臣自處

此方其驗如神故疏之以傳來世云爾

赤丹方五首

病源赤丹者初發癰起大者如連錢小者如麻豆肉上粟如雞冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸

丹出第三十卷中 肘後療面目身體卒得赤斑或黑斑如瘡狀或痒搔之隨手腫起不急療之日甚殺人方 羚羊角煎以

摩之數百遍若無用牛脂及猪脂有解毒藥者皆可用摩務令分散毒氣神妙

又若已遍身赤者方 生魚合皮鱗燒搗末以雞子白和遍塗之文仲備急用

又新附方 羚羊角無多少即燒之為灰令極細以雞子清和塗之極神效無雞子以水和塗之亦妙出

二卷中一云赤小豆一升羊角燒之三兩為末雞子白和敷之無羊角單用赤小豆良備急文仲同

集驗療人面目身體卒赤黑丹起如疥狀不瘵日劇遍身即殺人也 煎羊脂以摩之青羊脂最良千金文仲

肘後刪

又方 以猪槽下土泥塗之千金同又以飼猪狗炙燬之即差並出第八卷中

白丹方一十三首

外臺祕要

卷三十

出第三十卷中

病源白丹者初發痒痛微虛腫如吹軫起不痛不赤而白色由挾風冷故然色白也

一

肘後療白丹方 末鼓以酒和塗之搗香薷葉苦藜敷之

又方 屋上塵以苦酒和塗之

又方 燒鹿角作灰以猪膏敷之

又方 蜜和乾薑末敷之

備急文仲同

又方 酸模草五葉草煮飲汁又以澤瀉丹以養亦佳
集驗云有白丹者肉中起痒痛微虛腫如吹軫起者療之亦如赤丹法有雞冠者赤色丹起大者如連錢小者如麻麥豆粒肉上粟粟如雞冠肌理也方說一名為茱萸火丹療之如火丹法有水丹由體熱過水濕搏之結丹晃晃黃赤色如有水在其中喜著腹及陰處療之亦如火丹法其水丹著人足趺及踰脛間者作黃色如火丹狀經久變紫色不瘡皆成骨瘡也無毒非殺人疾若成骨瘡即難差也經言風邪客於肌中則肌虛真氣發散又被寒氣搏皮膚外發腠理開毫毛淫淫氣妄行之則為痒也所以有風癰風瘡疾皆由於此有赤癰者忽起如蚊蚤吮煩痒劇者連連重畜腫起極之逐手起有白癰者亦如此證也療之皆如療丹法也療之方 搗白瓷器屑猪膏和塗之

又方 燒猪矢灰和雞子白塗之
急文仲同

又方 崔氏療丹毒或發背及諸腫方 取馬齒草熟搗敷之數數易勿住若得藍淀和之更良

又方 以生羊牛肉貼數數易之良

又方 鼠粘草根勿使見風及犬見洗去土熟搗以敷腫處兼絞取汁飲之佳

又方 芩薺草蛇銜草慎火草相和熟搗敷之良數數易之

又方 搗鯽魚敷之數數易之良
出第五卷中

備急療白丹方 苾根三斤小豆四升水二斗煮以浴日三四遍
肘後文仲同
出第四卷中

丹癰方四首

病源丹癰者肉色不變又不熱但起癰癰相連而微痒故謂之丹癰出第三十卷中

尚德按熱千金作熟

千金翼療丹癰癰方 酪和鹽熱煮以摩之手下消也

又方 白芷根葉煮汁洗之效

又方 擣慎火葉封之神良

又方 以一條艾蒿燭竿以兩手極意尋之著壁伸十指當中指頭以大艾炷灸燭竿上令燭竿斷即止

灸十差於後重發更依此灸永差

赤癰白癰方一十一首

尚德按千金煮石南不用酒

千金云凡赤癰熱時發冷即止白癰天陰冷即發方 白癰以水煮白礬汁拭之又煮胡蘆著少酒以俗

又以酒煮石南拭之又水煮雞屎汁拭之又枳實汁拭之所療一如療丹法集驗同

又方 末白朮酒服方寸匕日三盡五斤

又方 淋石灰汁漬洗之

又方 煎白芷根葉作湯洗之

又方 芥子末以醋漿水服方寸匕日三服差

又療身體赤癰癰而痒搔之隨手腫方 莽草分二當歸 芎藭 躑躅花 大戟 細辛 芍藥 芫花

附子炮蜀椒各四分猪脂二升 右十一味切以猪膏合煎之候附子色黃膏成濾去滓收貯以敷病日

三以差為度

又方 礬石二兩酒三升漬令煬拭上立差

延年療赤白二癰丸方 白朮一斤 蔓荊子 防風各四分 附子二分 桂心二分 右五味擣篩蜜和為丸如梧

子大酒服十九日二服稍加至十五丸若能作散服一錢匕此療風癰正方凡風皆由舊來有風氣所

尚德按煬千金作消

以方中不得不用桂心附子白朮既用一斤附子只有二分復有防風其防風即能斷附子毒所以一物毒亦無所至伏聽進止

又其赤癰心家稍虛熱氣相搏其色赤宜作芒硝湯拭之方 芒硝三兩 右一味用湯一升內芒硝令消

散以帛子沾取拭癰即漸除湯盡更合

以前二件赤白癰方許崇處並出第十三卷中

古今錄驗云赤癰者由令濕折於肌中甚即為熱熱成赤癰也得天熱則劇取冷則減瘡之方 取生蛇

銜草搗極爛以塗之最驗

集驗小同

又白癰者由風氣折於肌中之熱熱與風相搏遂為白癰也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣身暖亦差瘡之方 水煮枳實拭之佳又搗末熬之青布裏熨之

集驗同出第三十卷中

肺風冷熱癰方二首

延年論曰凡風癰有二先受風寒氣其癰色白厚搔之即破應手下有道生此是肺家風冷氣宜外洗拭

即定方 吳茱萸一兩清酒一升煮取五合以軟帛取汁拭癰處不過三兩度即定如癰處多用盡更合

白癰即是肺藏受寒冷氣所發也

又瘡肺風熱皮膚生風結狀如癰或生風搔如水疥粟粒戢戢然方 天門冬八分去心枳實十二分白朮人

參各六分獨活苦參各五分有冷不用右六味搗篩蜜和為丸梧子大食後以飲下七丸日再服加至十九

忌如常法

出第十卷中

雜丹癰毒腫及諸色雜瘡方五首

刪繁瘡丹走皮中淫淫名火丹方 取蟻蠟末水和敷之

出第九卷中

千金瘡赤流腫方 榆根白皮搗末以雞子白和塗之

出第二十卷中

近效梔子湯主表裏俱熱三焦不實身體生瘡或發癰癰大小便不利方 芒硝 大黃各四分梔子 甘

草炙黃芩 知母各六分右六味切以水二升煮取九合去滓分溫服忌如常法此方甚佳

一方芒硝三兩大黃

尚德按病源侵作浸折作拆

尚德按月疑當作日

四兩梔子二七枚黃芩知母各三兩甘草二兩又以水五升煮減半下大黃煮取一升八合去滓內芒硝分三服

又療諸色瘡腫神驗方

即功草中處

胡粉熱令赤小豆熟糯米

吳茱萸

黃連各一兩

水銀二分

右六味搗

篩以生麻油和如稀麵糊然後取水銀於手掌中以唾指研熟訖入藥中令勻先椒湯洗瘡乾拭以藥

塗之日再以差為度瘡孩子瘡佳一云用滑

又牛夢療瘡腫方

取牛夢根二莖淨洗煮令爛於盆中研令細去筋脈汁中即下米煮粥鹹淡任性

服一碗甚良無忌

瘡方一十二首

疾源瘡者由膚腠虛風濕之氣折於血氣結聚所生多著手足間遞相對如新生茱萸子痛痒抓搔成

瘡黃汁出侵淫生長折裂時差時劇變化生蟲故名瘡瘡出第三十卷中

深師療瘡方

荆木燒取汁塗之救急

又方

灸瘡上周匝最良

並出第二十九卷中

集驗療瘡方

苦酒一升溫令沸以生韭一把內中以薄瘡上即差范汪

又方

雄黃兩黃芩兩松脂各二兩髮灰如彈丸大

右四味以白膏與松脂合搗以敷瘡上范汪文仲備急用黃連餘同

又方

亂髮頭垢等分螺殼二十枚燒以臘月猪脂和如泥以敷之范汪

又方

羊躑躅花三升以水漬之半月去滓以汁洗瘡一方灸鮮以敷瘡上蟲當出也范汪

又方

桃花鹽等分熟搗以醋和敷之范汪

又方

皂莢十枚苦酒四升煮之去滓煎如飴以敷瘡上范汪

又方

新瓦罐一口安雞屎一合酒煎成膏塗之

又方

穀木白汁合苦酒二小蒜半合釜月下土合

右四味和如泥塗之乾復塗並出第八卷中范汪同

刪繁療瘡瘰癧膏方

螺殼二七枚亂髮髮頭垢

龍膽末

右四味各等分合研如粉以三年油浚

和敷之加膩粉妙

又療癰瘡多汁方

水銀

八分以唾手掌中研令入藥用黃連八分胡粉八分熬

右三味黃連為末和以粉敷瘡上並出第二

十九

癰瘡久不差方五首

病源癰瘡積久不差者由膚腠虛則風濕之氣停滯蟲在肌肉之間則生長常痒痛故經久不差出第三卷

中

廣濟療癰瘡久不差方

豆豉熬令極乾為末先以泔清洗瘡拭乾以生麻油和之敷上差以油單片裹

之三日開未差更塗差止

又療諸癰瘡經年依手拂疽痒引日生不差瘡久則有疽蟲蟄蘆膏方

蘆分六黃連八礬石熬汁松脂

雄黃研各八分苦參分六

右六味搗以厚絹篩之用猪脂二升煎之候膏成去滓入雄黃礬石末攪令和調

待凝以敷之諸瘡經年或搔之汁出不生痂百藥療不差悉主之癰疥痒頭瘡亦效熱瘡者起瘡便生

白膿是也黃爛瘡者起瘡淺但出黃汁若肥瘡是也侵淫瘡者淺瘡黃汁出兼搔之漫延長不止是也

癰瘡者喜著手足相對痛痒折裂春夏隨差集驗同

又方 劉羊桃枝葉 右一味水煮以洗之三二度

劉涓子療久癰疥癰諸惡瘡毒五黃膏方

雄黃研二兩亂髮如雞子大黃連兩黃柏兩黃芩兩青木香各二兩

雞舌香兩白芷兩狼跋子四十枚雌黃二兩

右十味咬咀以苦酒半升漬諸藥一宿以臘月猪膏三升

煎取髮三四沸內諸藥又三沸止絞去滓膏成敷瘡日五過出第五卷中

崔氏療瘡積年不差瘡汁浸四畔好肉復變成瘡瘡色赤黑痒不可耐搔之並汁出者方 黃連 黃柏

豉心各三分搗為末一方加蔓菁子亦 水銀 油脂以上三物和之如泥

右六物若慮水銀不散可內

掌中細細和唾研之自當散訖然後攪胡粉等以塗瘡上仍取黃連末粉之此瘡多有黃汁著藥候汁

尚德按侵
疑當作浸

尚德按文
新從作大

尚德按先
和疑當作
和先

通按羊蹄
根或作大
蒜
尚德按分
字于金翼
在中字下

微即易之以差為度出第五卷中

癰瘡方一十一首

病源癰病之狀皮肉應癰如錢文漸漸增長或圓或斜痒痛有匡郭裏生蟲搔之有汁此由風濕邪氣客於腠理復值寒濕與血氣相搏則血氣不潤發此疾按九蟲論云蟻蟲在人腸內變化多端發動亦能為癰而癰內實有蟲也養生方云夏勿露面卧露下墮面皮厚及喜成癰出第三十卷中

肘後療癰瘡方 獨活根去土搗之一把許附子二枚炮搗以好酒和塗之三日乃發欲敷藥先以皂莢

湯洗拭令乾然後敷藥便愈出上卷中

深師療癰秘方 雄黃 硫黃兩各一羊蹄根 白糖 荷葉各一 右五味以後三種搗如泥合五種更

搗和調以敷之若強以少蜜解之令濡不過三差

又療癰神驗方 用雄黃研以瀉苦酒先和以新布拭癰上令傷以藥塗之神效

又方 萆薢細切取五升以水五斗煮取二斗以釀二斗米如酒法熟極飲令得極醉即愈未差更作無

有不愈一云長服萆薢末酒調並作丸佳

又方 取乾蟾蜍燒灰末以猪脂和塗之良出第二卷中

千金翼療癰秘方 搗羊蹄根分著瓷中以白蜜和之刮瘡四邊令傷先以蜜和者敷之如炊一石米久

拭去更以三年大醋和之以敷癰上燥便差若刮瘡處不傷即不差深師同出第三卷中

救急療癰方 先以針鑱癰上即搗瓜蒂末敷上仍先以泔洗之

又方 炷松脂搗薰黃末和更煎仍以泔清洗癰乃熱敷之一兩度即差並出第五卷中

必效療癰方 瀉甲煎塗之愈好口脂亦得

又方 附子一枚大皂莢一枚九月九日茱萸四合 右三味為散搗癰上令汁出敷之乾癰苦酒和塗之

深師古今錄驗同
並出第四卷中

尚德接侵
病源作浸

古今錄驗療癬方

作麻浮數癬上裏之差麻浮不差以鹽及豉和搗塗之即差止

乾濕癬方一十五首

病源乾癬但有匡郭皮枯索痒搔之白屑出是也皆是風濕邪氣客於腠理復值寒濕血氣與相搏所生

若其風毒氣多濕氣少故風沉入深故無汁為乾癬其中生蟲
又濕癬者亦有匡郭如蟲行侵淫赤濕痒搔之多汁成瘡是其風毒氣淺濕多風少故為濕癬也其中亦

有蟲出第三十卷中

肘後療燥癬方 水銀和胡粉研令調以塗之范汪同

又方 以雄雞冠血塗之范汪同

又方 胡粉熬令黃赤色苦酒和塗之乾即易差止

又方 以穀汁塗之

又方 搗桃白皮苦酒和敷之佳千金同

又療濕癬方 刮瘡令圻火灸指摩之以蛇牀子末和猪脂敷之差止

深師療乾濕癬神方 取狼毒末以苦酒研之如墨法先洗刮令傷以敷之不用大塗恐壞人肉范汪同

又烏梅煎治燥濕癬方 烏梅 大蒜各十枚 屋塵 鹽各三合 大麻子四合 右五味相和熟搗以苦酒一升

半拌和以敷之日三過差

又香瀝療燥濕癬及癩疥百瘡方 柏節 杉節 沉香節 松節各一 右四味悉碎一如指大以布

囊盛之竟令囊注麻腹中半食頃出漉先取一枚白坩穿去底令孔如雞鴨卵大以松葉一小把藉孔

上以坩安著白鹽以黃土泥坩坩合際令厚數分畢以藥內坩中以生炭著藥上使然其瀝當流入坩

中須然盡乃開出取坩中汁以薄瘡上日再用之療白禿疽疥惡瘡神效出第二十卷中

崔氏療乾濕癬方 取楮葉面著癬用匙背打葉葉碎即換可三四度換即差亦可只用一葉唯熟打使

通接麻腹
一作麻腹
俱未詳未
下是清汁
否
通按坩音
堪土器也
坩音歐聚
沙也

通按非瘡
音倍疊皮
狀外小腫起

尚德按鐵
最當作瘡
說見第八
卷中

極碎即裹之勿令碎葉落即差

又瘡乾癬積年亦厚搔之黃水出每逢陰雨即痒方 取巴豆肥者一枚炭火上燒之令脂出即於斧上

以指研之如杏澀法以塗癬上薄敷之不過一兩度便愈 尚德按李時珍本草云下引王履農書云凡

可和水調敷
食杏澀疑是

又瘡乾癬諸治不差者方 但看癬頭有痒瘡子處即以小艾炷灸之差 出第五
卷中

古今錄驗瘡濕癬方 石硫黃研大醋三年者和敷數瘡上

又方 蛇牀子 黃柏 黃連 胡粉 各一名研 右四味搗篩為散內水銀一棗大和猪膏研入相和以塗

瘡云是驗方

又方 取肥豬肉薄割之於鐵上炙之令熱以薄瘡上日三四度 出第四
十卷中

疥癬惡瘡方五首

廣濟瘡疥癬惡瘡方 石硫黃六兩白礬十二兩熬並於瓷器中研以烏麻油和稠調如煎餅麵更熟研

敷之熱炙疥癬上摩一二百下乾即移摩之取差 出第五
卷中

劉涓子瘡疥癬惡瘡膏方 丹砂 雄黃 各一名研 亂髮 白蜜 松脂 別入各一兩 蘭茹 三兩 巴豆 十四枚去皮 猪膏 二升

右八味先煎猪膏亂髮消盡內松脂蜜三上三下絞去滓末蘭茹石藥內膏中更一沸以攪令極調以

敷瘡上日三差止神效 出第五
卷中

救急瘡癬瘡方 白礬石 熟多年非根 雄黃 研 藜蘆 瓜蒂 胡粉 各一 水銀 三 右七味以柳木杵

研水銀使盡用猪脂一升煮藜蘆非根瓜蒂三沸去滓入石藥等攪令相得以敷瘡上甚妙

近效瘡熱瘡疥癬痒痛不可忍者方 硝石一物先用泔清洗瘡去痴拭乾瘡大小研硝石末和生麻

油如麵糊以塗瘡上三兩度差

又方 水銀蕪夷酥和塗之 薑黃塗之 牛李子塗之 醋煎艾塗之 羊蹄根和乳汁塗之 出第三
十卷中

疥風痒方七首

肘後療疥方 石灰二升以湯五升浸取汁先用白湯洗瘡拭乾乃以此汁洗之有效出第六卷中

深師療疥大黃膏方 黃連十四錄 藜蘆十二錄 大黃一錄 乾薑十四錄 蘭茹十一錄 莽草十二錄 羊躑躅十錄 右七味搗

篩以成煎猪脂二斤微火向東煎之三上三下膏成去茄汁盡付之神效合時勿令婦人雞犬見之出第七卷中

二十九

集驗療疥方 搗羊蹄根和猪脂塗上或著少鹽佳范注

又療疥及風瘙瘡苦痒方 丹參 苦參各四兩 蛇牀子一升 右三味切以水六升煎之以洗疥瘡以粉粉

身日再為之即差

備急葛氏療疥瘡方 取棟根削去上皮切皂莢去皮子等分熟搗下篩脂膏和搔痒去痴以塗之護風


勿使女人小兒雞犬見之范注

又療方 石硫黃無多少研粉以麻油或以苦酒和塗摩之以酒漬苦參飲之並出第五卷中

薰疥方 取艾如雞子大先以布裹亂髮於紙上置艾熏黃末硃砂末杏仁末水銀各如杏仁許水銀於

掌中以唾研塗紙上以卷藥末炙乾燒以熏之一云筒瓦一口一同安皮蓋上以繩束之用熏疥於脚

損



W2467 W

1915

v. 29-30